

PORTUGUÊS

TEXTO

BRASIL, MOSTRA TUA CARA

(...)

A parte que nos coube no latifúndio dessas relações foi um projeto econômico incapaz de integrar à cidadania massas excluídas de um consumo ao menos decente. E a crença míope de que reduzir juros e corrigir câmbio poderia ser feito antes de se desorganizar o sistema produtivo nacional; de que a integração crescente do país ao mercado de economia mundial seria suficiente para assegurar nosso desenvolvimento; de que o fatalismo histórico seria suficiente para nos converter em grande potência.

Um pedaço do país crescentemente se integra na economia e na cultura dos países ricos, enquanto o outro pedaço batalha pela sobrevivência diária. Somos ao mesmo tempo modernos e atrasados, ricos e carentes, auto-suficientes e dependentes. Pensar o futuro, por tudo isso, deveria ter como referência básica a inclusão. Inclusão tecnológica e econômica, é certo. Mas, também, social. Só que perdemos, como povo, o sentimento do coletivo. E o amanhã é incerto.

Nosso futuro tem como cenário um choque de realismo nas sociais-democracias do primeiro mundo, a deterioração da economia socialista no segundo mundo, e o fim do ciclo nacional-desenvolvimentista no terceiro mundo, sem que se saiba bem se caminharemos em direção à consumação da globalização, a integrações regionais, ou mesmo, a algum tipo de retorno aos nacionalismos.

Chegamos a um novo tempo. E há razões para otimismo. É preciso que a razão vença o preconceito. Que a confiança no futuro vença a nostalgia do passado. Que o fazer bem vença as (apenas) boas intenções. Que o homem, barro trágico rareado de estrelas, reine imponente e majestoso sobre o mercado, a força bruta, os pequenos interesses e tudo o mais quanto exista neste vasto e insensato mundo. Para todo o sempre. Amém.

FILHO, José Paulo Cavalcanti. In: **Escritas Atemporais** Ed. Bagaço. Recife, 200.p.1 Adaptado.

01. No trecho compreendendo A parte que nos coube até E o amanhã é incerto,

- A) o autor se reporta a um passado e à rica herança deixada para toda a população brasileira.
- B) o autor aponta uma série de procedimentos que resultariam em benefícios ao país.
- C) de linguagem vulgar, o texto agride o leitor, causando, até mesmo, repúdio.
- D) inexistem meios ou procedimentos que restaurem a “saúde” do nosso país.
- E) há uma comparação entre o hoje e o futuro do país.

02. No segundo trecho do texto, o autor declara

- A) a necessidade de haver inclusão como forma de projetar um futuro otimista ao país.
- B) que o país não apresenta diferenças que ameçam o progresso da nação.
- C) que ao país falta organização e disciplina quanto à distribuição das tarefas.
- D) ser radicalmente contrário à inclusão social no país.
- E) que o sentimento de coletividade é transbordante em todo o país.

03. Com o último trecho, o autor nos transmite

- A) a visão de um horizonte de cenários pessimistas e trágicos a toda a nação.
- B) a importância de desacreditar em mudanças profícuas ao país.
- C) que o tempo de nostalgia é algo que se perpetuará no futuro.
- D) a necessidade de não sermos solidários aos dirigentes da nação.
- E) uma visão otimista para a realidade de vida dos brasileiros.

04. Ainda no último trecho, percebe-se o quanto o autor

- A) depreciou o homem em toda a sua essência.
- B) valorizou o homem como elemento vital promotor de mudanças benéficas a todo o contexto nacional.
- C) repudiou o indivíduo, por julgá-lo incapaz de promover mudanças.
- D) enfatizou as diferenças sociais e a impossibilidade de se viabilizarem mudanças.
- E) enalteceu o homem e todo o seu potencial para desintegrar relações sociais.

05. Com o trecho “Chegamos a um novo tempo”, entende-se que

- A) todo o cenário mantém-se inalterado.
- B) o passado caminha atrelado ao presente, sem existirem mudanças.
- C) se trata de uma nova fase, numa perspectiva otimista.
- D) o futuro não vislumbra horizontes “azuis” à população envolvida.
- E) o tempo novo se preocupará em imitar sempre o tempo velho.

06. Sobre COLOCAÇÃO PRONOMINAL, analise os itens abaixo e seus comentários.

- I. “A parte que nos coube no latifúndio...” – o pronome relativo **que** atrai o pronome pessoal, daí ser obrigatória a próclise.
- II. “...para **nos** converter em grande potência.” – neste caso, o pronome está proclítico.
- III. “Um pedaço do país crescentemente se integra na economia...” – pelo fato de inexistir palavra atrativa, indiferentemente pode-se usar o pronome proclítico ou enclítico ao verbo.
- IV. “...sem que se saiba bem...” – a próclise, neste caso, é obrigatória devido à presença da conjunção “sem que.”

Assinale a alternativa cujos comentários dos itens estão corretos.

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) I, II e IV apenas.
- D) III e IV apenas.
- E) I, II, III e IV.

07. Sobre CRASE, observe o trecho abaixo.

- “...sem que se saiba bem se caminharemos em direção a consumação da globalização, a integrações regionais, ou mesmo, a algum tipo de retorno aos nacionalismos.”

Em relação aos termos sublinhados, é correto declarar que

- A) o primeiro recebeu acento grave por existir a presença, apenas, da preposição *a*.
- B) no segundo, existe, apenas, a presença do artigo *a*.
- C) no terceiro, existe, apenas, a presença da preposição *a*, daí não ocorrer a crase.
- D) no primeiro e no terceiro termos, existe, apenas, a presença do artigo *a*.
- E) no segundo e no terceiro termos, inexistente a presença de qualquer preposição.

08. Sobre as funções do QUE, é correto declarar que no último trecho

- A) todo **que** nele contido se classifica como conjunção integrante, iniciando uma oração subordinada substantiva.
- B) apenas um **que** se classifica como preposição.
- C) existe, apenas, um pronome relativo **que**.
- D) existe, apenas, uma conjunção integrante **que**.
- E) inexistente qualquer tipo de conjunção.

09. Em qual das alternativas o emprego da (s) vírgula (s) se justifica por isolar o aposto ?

- A) “Pensar o futuro, por tudo isso,...”
- B) “Inclusão tecnológica e econômica, é certo.”
- C) “Mas, também, social.”
- D) “Só que perdemos, como povo, o sentimento do coletivo.”
- E) “Que o homem, barro trágico rareado de estrelas, reine...”

10. Sobre o trecho “Que a confiança no futuro vença a nostalgia do passado”, analise as proposições e seus comentários.

- I. “No futuro” está ligado ao nome “confiança,” daí ser um complemento nominal.
- II. O verbo nele existente exige um complemento regido de preposição.
- III. Nele inexistente exemplo de crase, uma vez que só há a presença, em ambos os casos, do artigo *a*.
- IV. “No futuro” é exemplo de complemento verbal regido de preposição.

Estão corretos os comentários das proposições

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) II e IV apenas.
- D) I, II e III apenas.
- E) II e III apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. O Cateterismo Vesical tem indicação terapêutica e diagnóstica. Consiste na introdução de um tubo fino e maleável – catéter – no meato urinário, indo até a cavidade vesical. Após essa afirmação, leia as alternativas abaixo e, em seguida, assinale a correta.

- A) A cateterização vesical de demora é a primeira escolha, quando se detecta que um paciente está com bexigoma.
- B) O tempo de permanência da sonda vesical de demora independe do diagnóstico do paciente, uma vez que esse tempo está relacionado apenas à comodidade do paciente.
- C) Antes de realizar o cateterismo vesical, é necessário que o enfermeiro faça um exame físico sucinto, para detectar alterações que possam repercutir no desenvolvimento do procedimento.
- D) Após instalar a sonda vesical de demora, o enfermeiro conecta um coletor aberto, pois a indicação é que o tempo de permanência seja 24 horas.
- E) O cateterismo vesical é considerado um procedimento invasivo, porém não há risco relacionado ao uso do catéter vesical.

12. Preparação, cálculo e administração de medicação são habilidades que o enfermeiro possui e desempenha. Leia as sentenças abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- I. Na prescrição de 1000ml de Soro Glicosado a 5% de 8/8 horas nas 24 horas; ao fazer o cálculo o enfermeiro encontra 17 gotas/min; 47 microgotas/min e 38 ml/hora.
- II. Estão prescritas 800mg IV de Cefalotina. No posto de enfermagem, o enfermeiro dispõe de Cefalotina 1g que deve ser diluída em 4ml. É correto administrar uma dose de 3,2ml.
- III. A insulina é um medicamento administrado por via subcutânea, sendo introduzida na tela subcutânea, também chamado tecido subcutâneo, por ser uma via de rápida absorção.
- IV. Os anticoagulantes são medicamentos que impedem a formação de coágulos, utilizados, normalmente, na prevenção de Trombose Venosa Profunda (TVP).

- A) F, V, F, V.
- B) V, V, V, V.
- C) F, F, F, V.
- D) V, V, F, V.
- E) V, F, V, V.

13. A inserção e o manuseio de uma sonda gástrica ou duodenal requer noções de anatomia, avaliação e planejamento sobre o paciente. Para este procedimento, o enfermeiro reconhece que

- A) o local ideal para alimentar o paciente é o duodeno, em função da distensibilidade e ácidos essenciais para a digestão.
- B) o uso da via nasal para instalação de sonda é o mais comum, por ser de maior tolerância para pacientes lúcidos.
- C) não é possível administrar medicação (comprimido por sonda enteral), pois não há como pulverizar os comprimidos, uma vez que o lúmen da sonda nasoenteral é estreito.
- D) são indicações para alimentar um paciente com sonda nasogástrica: história de aspiração de dieta, distúrbio eletrolítico (atonía gástrica), resíduo gástrico elevado.
- E) se houver atraso na administração da dieta, colocá-la na geladeira; ao realizar o procedimento, infundir a alimentação, pois a dieta nesta temperatura facilita o processo digestivo.

14. A Central de Material e Esterilização atualmente ocupa posição de destaque; nos hospitais, viabilizam insumos básicos necessários para uma grande quantidade de atividades realizadas junto ao paciente.

Considerando a afirmativa, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.

- A) Desinfecção é o processo indicado para artigos não críticos, que são aqueles que entram em contato com membranas, mucosas ou pele não intacta.
- B) O calor seco é um processo de esterilização realizado mediante produção de calor. É o processo de primeira escolha na CME, pois a penetração do calor e o período de exposição dos artigos são rápidos e uniformes.
- C) A esterilização no autoclave compreende a remoção do ar, seguindo-se a admissão do vapor e a exposição dos artigos; considerar o tempo de penetração e o de esterilização, mantendo-se um intervalo de confiança, a exaustão do vapor e o tempo de secagem.
- D) O reprocessamento de artigos pode ser realizado, independentemente dos aspectos éticos, econômicos, riscos relativos ao paciente e método de esterilização utilizado.
- E) A exposição contínua e não controlada ao óxido de etileno não provoca efeitos adversos, uma vez que este gás promove alquilação sobre os principais componentes da matéria viva e, particularmente, sobre enzimas e ácidos nucleicos.

15. As lesões intra-abdominais são responsáveis por uma grande quantidade de morte nos pacientes vítimas de traumas. Na assistência ao paciente com trauma abdominal, o enfermeiro

- I. faz uma avaliação inicial e avalia, apenas, a história do mecanismo do trauma.
- II. realiza o atendimento inicial ao paciente, puncionando, no mínimo, duas veias calibrosas, principalmente, quando há instabilidade hemodinâmica.
- III. identifica, apenas, o método diagnóstico na sondagem gástrica.
- IV. reconhece ser contra-indicada a sondagem vesical, quando há traumatismo de uretra.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas.

- A) II e IV.
- B) II, III e IV.
- C) III e IV.
- D) I e III.
- E) I e IV.

16. A assistência de enfermagem é fundamental para o atendimento do paciente portador de convulsão. Ao assistir o paciente em crise convulsiva, o enfermeiro deve

- A) identificar a natureza da convulsão, classificando como idiopáticos os distúrbios convulsivos, causados por hiponatremia ou hipocalcemia.
- B) ao atender um paciente idoso com distúrbio convulsivo, reconhecer que metástase cerebral e o acidente vascular cerebral são as principais causas deste agravo nesta faixa etária.
- C) observar os sinais e os sintomas apresentados no período posterior à crise convulsiva, identificando a perda da memória por curto período de tempo como definidora de mau prognóstico.
- D) tranquilizar os familiares no sentido de orientá-los quanto à impossibilidade de danos cerebrais, mesmo quando a convulsão for grave e prolongada.
- E) ter como meta terapêutica imediata, determinar e controlar a causa do distúrbio convulsivo.

17. Problemas associados ao sistema músculo-esquelético têm impacto sobre as atividades cotidianas produtivas do indivíduo. As infecções deste sistema permitem ao enfermeiro traçar diagnósticos de enfermagem e intervenções. Quanto à osteomielite, responda.

- A) Dor relacionada à infecção e edema é um dos diagnósticos de enfermagem para o paciente portador de osteomielite.
- B) Ao planejar a terapêutica do paciente com osteomielite, deve-se diminuir, ao máximo, a ingestão de proteínas e vitaminas. Os carboidratos devem ser à base da dieta.
- C) Promover a mobilidade física é fundamental para pacientes com osteomielite, o exercício precoce deve ser incentivado.
- D) Um dos mecanismos de controle do processo infeccioso na osteomielite é realizado através da verificação de temperatura; na osteomielite crônica, há um aumento matutino deste sinal vital.
- E) Na anamnese do paciente, o enfermeiro deve averiguar fatores de risco para o aparecimento da osteomielite. São eles: ser idoso, em uso de antibioticoterapia, portador de doença vascular.

18. O Diabetes Mellitus é uma doença crônica não transmissível, cujo diagnóstico precoce e o controle da patologia são fundamentais para a prevenção de complicações. Sobre a automonitorização da glicose sanguínea, responda.

- A) A glicemia capilar para o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM), deve ser realizada, apenas, para os pacientes que utilizam insulina em seu tratamento.
- B) A glicemia capilar é um dos procedimentos responsáveis para o controle do DM; deve ser realizada utilizando, preferencialmente, gota espessa de sangue.
- C) A frequência ideal para pacientes DM tipo2 realizarem glicemia de jejum é de quatro testes diários, antes de cada refeição e a noite, ao deitar.
- D) A coleta de sangue, para realização da glicemia para automonitorização, deve ser realizada através de veia periférica, após as devidas orientações para o teste.
- E) A glicemia do sangue capilar em paciente DM tipo2 não deve ser realizada entre 2 e 3 horas da manhã, pois este é, efetivamente, o horário de aparecimento da hiperglicemia (efeito Somogyi).

19. As infecções do trato urinário são consideradas as mais comuns do Sistema Urinário. Sobre este agravo e seu controle, responda.

- A) Os principais microorganismos causadores da infecção urinária em mulheres são aqueles encontrados no trato respiratório, são eles: *staphylococcus aureus*, *Klebsiella* e *pseudomonas*.
- B) O procedimento de sondagem vesical de demora diminui o risco de infecção do trato urinário para pacientes que apresentam refluxo uretrovesical.
- C) O efeito antiaderência consiste no controle dos microorganismos que penetram na uretra e na bexiga, através das células da mucosa vesical que produzem substâncias, como o glicosaminoglicano, que atrai moléculas de água e promove a proteção da bexiga.
- D) Os locais mais comuns de infecção urinária são, respectivamente, os rins, causando pielonefrite, a bexiga, cistite e, finalmente, a uretra, causando uretrite.
- E) Em pacientes com dificuldade de esvaziar a bexiga, o enfermeiro deve sugerir, imediatamente, a instalação de sonda de alívio como possibilidade de aumentar o efeito antiaderência através do uso deste dispositivo e, assim, promover o controle da infecção do trato urinário.

20. O choque cardiogênico é uma disfunção da bomba cardíaca. Para dar assistência ao paciente nesta condição, o enfermeiro deve

- A) reconhecer como sinais e sintomas de choque cardiogênico taquisfigmia e hipertensão grave.
- B) incentivar o paciente a ingerir bastante líquido, 2000ml/ dia, pois a ingesta hídrica é fundamental para o controle do choque.
- C) controlar a dor torácica que é uma das metas do enfermeiro para o atendimento ao choque; deve-se utilizar crioterapia úmida para reduzir a dor do paciente.
- D) reconhecer que o choque cardiogênico pode ser de etiologia coronária ou não coronária, onde o coronário é mais comum, e é visto, mais freqüentemente, em pacientes enfartados com lesão extensa.
- E) administrar drogas vasoativas no tratamento do choque cardiogênico coronário, para diminuir a contratilidade cardíaca aumentar a pré-carga e diminuir a pós-carga, estabilizando a freqüência cardíaca.

21. Entre as drogas ilícitas mais consumidas pelos estudantes brasileiros, podemos citar que está em primeiro lugar o(a)

- A) álcool.
- B) cocaína.
- C) maconha.
- D) cigarro.
- E) crack.

22. A Reabilitação Psicossocial é um importante passo da reforma psiquiátrica no Brasil. Nela estão incluídas as ações de enfermagem voltadas para

- A) encaminhamentos de pacientes crônicos para unidades de internação.
- B) monitorização de indivíduos assintomáticos.
- C) atividades em grupos nos serviços de cuidados continuados, como os grupos de apoio, hospital-dia, oficinas terapêuticas, entre outros.
- D) promover e prevenir doenças.
- E) prevenir o movimento desinstitucionalização.

23. O Movimento Brasileiro de Reforma Psiquiátrica teve seu início com a

- A) construção do primeiro CAPS brasileiro em 1987 no Ceará.
- B) construção do primeiro PSF em Quixadá –Ceará.
- C) instalação de 42 equipes de PSF em Sobral-Ceará.
- D) identificação de transtornos mentais, de acordo com o DSM-IV em 1994.
- E) visita de Franco Basaglia ao Brasil em 1979.

24. Em relação às doenças infecto-parasitárias, é incorreto afirmar.

- A) O bacilo causador da Hanseníase tem capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade), propriedades estas que não são em função, apenas, de suas características intrínsecas, dependem ainda das características do hospedeiro e grau de endemicidade do meio.
- B) Os doentes paucibacilares (indeterminados e tuberculóides) não são considerados importantes como fonte de transmissão da doença, devido à baixa carga bacilar.
- C) Como objetivo do Programa de Controle da Hanseníase, pode-se citar: diagnosticar precocemente e tratar adequadamente todos os casos de hanseníase.
- D) Como atividades de Vigilância Epidemiológica, pode-se citar atividades com os contactantes dos doentes, estabelecendo: exame clínico-dermatológico de contatos; vacinação com BCG dos contatos indenes e tratamento imediato dos contatos doentes.
- E) A prova tuberculínica prévia antecede a vacinação BCG.

25. No Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM, as ações são destinadas a prevenir as doenças ou promover e recuperar a saúde da mulher de forma integral.

Coloque **V** na afirmativa **verdadeira** e **F** na afirmativa **falsa**.

- () Um dos objetivos do PAISM é evitar o aborto provocado, mediante a prevenção da gravidez indesejada e implantar ou ampliar as atividades de identificação e de controle de outras patologias de maior prevalência no grupo feminino.
- () O conceito de integralidade da assistência pressupõe uma prática educativa que permite a apropriação pela cliente dos conhecimentos necessários a um maior controle sobre a saúde .
- () A assistência clínico-ginecológica é voltada apenas para a identificação, diagnóstico e tratamento das patologias sistêmicas e para as patologias do aparelho reprodutor feminino.
- () Os conteúdos da assistência integral à saúde da mulher serão desenvolvidas através de atividades de assistência clínico-ginecológica, assistência pré-natal, ao parto e ao puerpério imediato.
- () A assistência pré-natal é conjunto de procedimentos clínicos e educativos com o objetivo de promover a saúde e identificar, precocemente, os problemas que possam resultar em risco para a saúde da gestante e do concepto.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta das afirmativas.

- A) V, F, V, V, V. B) V, V, F, V, V. C) F, V, F, V, V. D) V, V, V, V, F. E) F, V, V, V, V.

26. A prevalência significativa da violência intrafamiliar constitui sério problema de saúde e grave obstáculo para o desenvolvimento sócio-econômico, uma flagrante violação dos direitos humanos.

Assinale a alternativa correta.

- A) São consideradas um dos fatores de risco das famílias as relações que não são centradas em papéis e funções rigidamente definidas.
- B) É considerada um dos fatores de risco da criança a gravidez de pais adolescentes com suporte psicossocial.
- C) A violência intrafamiliar é um problema social que atinge, de forma continuada, especialmente, mulheres, crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência.
- D) Entre os compromissos e as estratégias de prevenção da violência intrafamiliar, deve-se desestimular atividades de flexibilidade e responsabilidade nas relações afetivas e familiares.
- E) A promoção de alternativas de organização social e familiar diminui a incorporação da igualdade dos membros familiares, estimulando o fortalecimento da autonomia e auto-estima.

27. O Ministério da Saúde preconiza que o crescimento e o desenvolvimento da criança e do adolescente devem ser monitorizados, com o intuito de detectar e prevenir certas doenças. Diante do exposto, qual a conduta diante de uma criança com curva de crescimento na horizontal?

- A) Criança com leite materno, manter e observar por mais um mês.
- B) Criança com leite materno, suspender e oferecer leite artificial.
- C) Criança com leite artificial, suspender, imediatamente, e tentar relactação.
- D) Criança com leite artificial, avaliar problemas emocionais com a mãe.
- E) Criança com leite materno, avaliar sucção, atividade da criança e pega.

28. As competências do setor saúde e os modelos institucionais de organização da proteção e controle sanitários são variados entre os países. No Brasil, as competências dos serviços de vigilância sanitária são abrangentes. São funções da vigilância sanitária em nível estadual, exceto

- A) Normatização e controle sanitário de bens, da produção, do armazenamento, da guarda, da circulação, do transporte, da comercialização e do consumo de substâncias e produtos de interesse à saúde.
- B) Normatização e controle sanitário de tecnologias médicas, sangue, tecidos e órgãos, procedimentos e equipamentos e aspectos da pesquisa em saúde.
- C) Normatização e controle sanitário de serviços direta ou indiretamente relacionados com a saúde, prestados pelo Estado e setor privado.
- D) Normatização e controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras, contemplando meios de transporte, cargas e pessoas.
- E) Normatização e controle sanitário de aspectos de meio-ambiente, ambiente e processos de trabalho e saúde do trabalhador.

29. Com relação à epidemiologia, identifique as afirmativas verdadeiras com (V) e as afirmativas falsas com (F).

- () A epidemiologia é uma disciplina básica da saúde pública que tem como objeto de estudo o processo saúde-doença no âmbito de populações, o que diferencia da clínica, que tem por objeto esse mesmo processo ao nível individual.
- () A epidemiologia constitui instrumento para o desenvolvimento de políticas de saúde, pois subsidia no conhecimento da situação de saúde de grupos populacionais.
- () Na explicação das circunstâncias como ocorre o processo saúde-doença, a epidemiologia procura responder as seguintes questões: Quando ou em que período ocorreu a doença ou agravo? Onde ocorreu? Quais as características demográficas, econômicas e sociais das pessoas afetadas? Há grupo especial mais exposto? Há região mais atingida?
- () A epidemiologia, enquanto contribuição para o serviço de saúde, subsidia a análise da situação de saúde, o planejamento e a avaliação das ações de saúde (promoção à saúde; prevenção controle e tratamento da doença).

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta das afirmativas.

A) V, V, F, F.

B) V, V, V, F.

C) V, V, V, V.

D) F, F, F, V.

E) F, V, F, V.

30. Com relação a indicadores de saúde, é incorreto.

- A) O coeficiente de mortalidade infantil mede o risco de morrer no primeiro ano de vida.
- B) O coeficiente de letalidade reflete a gravidade da doença e a qualidade da assistência médico-hospitalar.
- C) O coeficiente de morte materna é uma medida de risco relativa à mulher no período gravídico-puerperal e reflete a qualidade da assistência a saúde da mulher.
- D) A mortalidade proporcional por faixa etária indica a faixa de maior risco de morrer.
- E) Afirmar que o coeficiente de incidência de sarampo, foi maior entre crianças de 1 a 5 anos, significa que este grupo apresenta uma maior probabilidade de adoecer por sarampo .