



## TEXTO

**QUEM É O MELHOR CHEFE?**

*Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando? Seu diretor protege a equipe? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil. Não é à toa que eles chegaram à chefia.*

*Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam. Os perfis não são excludentes. Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.*

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58.

**01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que**

- A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe.
- B) na contemporaneidade, o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.
- C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo.
- D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha.
- E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer empresa.

**02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo?**

*“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo)*

- A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos.
- B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados.
- C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil.
- D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa.
- E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa.

**03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas delas. Assinale a alternativa que as contempla.**

- A) Ser metódico, pontual e dedicado.
- B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo.
- C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes.
- D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor.
- E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações.

**04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.**

- A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer mudança de significado.
- B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”.
- C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna” poderia substituir o termo sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.
- D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo “fragmenta”.
- E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por “inclusivos”.

**05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo.**

- I.** “Não é à toa que eles chegaram à chefia.”
- II.** “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.”
- III.** “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.”

Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) No item I, a primeira crase é facultativa.
- B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave.
- C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo.
- D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave.
- E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”.

06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria a Regência Nominal ou a Verbal.

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”.
- B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição.
- C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”.
- D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do verbo sublinhado e não vem regido de preposição.
- E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como complemento do verbo sublinhado.

07. Sobre o trecho abaixo:

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.”

é correto afirmar que

- A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”.
- B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente.
- C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”.
- D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos.
- E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo.

08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se encontra inserido.

- A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”
- B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”
- C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”
- D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”
- E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”

09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações ?

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”
- B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”
- C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”
- D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”
- E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”

10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.




I



II



III



IV



V

É correto afirmar que

- A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento.
- B) no quadro II, inexistente a presença de pronome.

## CONCURSO PÚBLICO

- C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês.
- D) no quadro V, o termo tu se classifica como pronome pessoal oblíquo.
- E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### 11. Segundo o Ministério da Saúde, os parâmetros para diagnóstico de hipertensão arterial, no adulto são:

- A) PA sistólica >135mmHg ou PA diastólica >85 mmHg em pelo menos duas verificações.
- B) PA sistólica >1250mmHg ou PA diastólica >95 mmHg em pelo menos duas verificações.
- C) PA sistólica >120mmHg ou PA diastólica >75 mmHg em pelo menos duas verificações.
- D) PA sistólica >120mmHg ou PA diastólica >80 mmHg em pelo menos duas verificações.
- E) PA sistólica >140mmHg ou PA diastólica >90 mmHg em pelo menos duas verificações.

#### 12. Sobre Hipertensão Arterial (HA), leia as sentenças abaixo.

- I. Ao realizar a anamnese do cliente hipertens, o enfermeiro dá um maior enfoque ao hábito de fumar, de beber, aumento de peso, uso de anticoncepcionais e sinais e sintomas sugestivos de lesão em órgão-alvo e/ou causas secundárias de hipertensão.*
- II. O Enfermeiro, ao examinar a pressão arterial do cliente hipertenso, verifica a PA em ambos os membros superiores com os paciente sentado, deitado e em pé.*
- III. Na anamnese do paciente hipertenso, o enfermeiro enfoca os mesmos pontos que qualquer paciente portador de doença crônica não transmissível – DCNT.*
- IV. Faz parte do exame físico do portador de HA pesar e medir o paciente, para estabelecer o índice de massa corporal IMC= Peso /Altura.*

#### Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III e IV apenas.
- C) I II e IV apenas.
- D) II e IV apenas.
- E) II, III e IV apenas.

#### 13. Em relação aos distúrbios cardiovasculares, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.

- A) Ao fazer um histórico de enfermagem de um paciente portador de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), o enfermeiro não deve avaliar o débito urinário nem valorizar sinais e sintomas do aparelho respiratório.
- B) Na avaliação do paciente, o enfermeiro identifica arritmias, intoxicação digitalica e alcalose metabólica, atribuindo essas alterações à hipercalcemia.
- C) O paciente apresenta os seguintes sintomas: dor torácica, com irradiação para o braço, hipotensão, dispnéia, taquicardia, palidez, náuseas e ansiedade, características que foram evidenciadas pelo enfermeiro como: Choque Cardiogênico.
- D) As alterações das enzimas não são indicadores confiáveis para o diagnóstico de IAM.
- E) A dor do infarto se difere da dor esofágiana por ser subesternal e/ou sobre o precórdio, podendo se disseminar amplamente pelo tórax, ocasionando algumas vezes incapacidade dolorosa dos ombros e mãos, tendo duração maior que 15 minutos.

#### 14. Sobre assistência de enfermagem aos pacientes com distúrbio do sistema gastrointestinal, leia as sentenças abaixo.

- I. Na Hemorragia digestiva alta, o Enfermeiro orienta o cliente a ingerir dieta oral morna, reduzir o estresse e manter via aérea permeável.*
- II. Na Hemorragia digestiva alta, o Enfermeiro instala SNG, realiza lavagem gástrica, mantém a sonda nasogástrica fechada e monitora SSVV.*
- III. Na Hemorragia digestiva alta, o Enfermeiro avalia perda sanguínea, monitora SSVV, realiza lavagem gástrica, avalia hematócrito e hemoglobina, instala sonda nasogástrica e sonda vesical de demora, monitora débito urinário.*
- IV. Na Hemorragia digestiva alta, o Enfermeiro identifica e controla a hematêmese, monitora sinais vitais, observa sinais de choque hipovolêmico, débito urinário, presença de melena e dor abdominal.*

#### Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) II, III e IV apenas.
- C) III e IV apenas.
- D) II e III apenas.
- E) I e III apenas.

#### 15. Sobre a Reforma Psiquiátrica, leia as sentenças abaixo.

- I. A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades e no mercado dos serviços de saúde.*

## CONCURSO PÚBLICO

- II.** Em 1978, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), através de variados campos de luta, passa a protagonizar e a construir, a partir deste período, a denúncia da violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais.
- III.** A Reforma Psiquiátrica brasileira teve como marco os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) no município de Santos, que funcionam 24 horas; foram criadas cooperativas, residências para os egressos do hospital e associações.
- IV.** Em 1989, dá entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do deputado Paulo Delgado (PT/MG), que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.      B) I, II e IV apenas.      C) II e III apenas.      D) I, III e IV apenas.      E) I e IV apenas.

**16. No atendimento ao paciente epilético, o enfermeiro interroga sobre a história da doença, fatores desencadeantes, uso de bebida alcoólica e limitações enfrentadas pelo paciente. Com relação à educação do paciente sobre anticonvulsivante, é correto afirmar.**

- I.** O paciente que faz uso de anticonvulsivante não precisa evitar atividades que exijam estado de alerta e boa coordenação, pois não há necessidade de avaliar os efeitos da medicação.
- II.** O paciente deve tomar o anticonvulsivante diariamente, para manter o nível sanguíneo constante e assim evitar convulsões.
- III.** O paciente que faz uso de anticonvulsivante quando vai coletar sangue para exames laboratoriais, diversos, não precisa relatar o uso de anticonvulsivante.
- IV.** A bebida alcoólica está liberada no curso da terapêutica medicamentosa para epilepsia (anticonvulsivante) bem como fazer uso de outras medicações que não sejam o anticonvulsivante, sem consultar o médico e cessar o uso dos mesmos quando achar necessário.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II, III e IV.      B) II apenas.      C) II e III apenas.      D) I e IV apenas.      E) I e III apenas.

**17. As convulsões são episódios de atividade motora anormal sensorial, autônoma ou psíquica. Para o Enfermeiro assistir ao cliente em crise convulsiva deve**

- A) identificar as causas da convulsão e, só após, realizar a assistência de enfermagem correta.
- B) proteger e lateralizar a cabeça do cliente, evitando traumatismos e broncoaspiração pulmonar.
- C) realizar avaliação do balanço hidroeletrólítico.
- D) puncionar veia periférica durante a crise convulsiva para controlar movimentos tônicos clônicos.
- E) posicionar o paciente em decúbito de fowler e conter os MMII e MMSS.

**18. Sobre pacientes com distúrbio músculo-esquelético, leia as alternativas abaixo e assinale a correta.**

- A) O Enfermeiro reconhece a luxação de ombro como uma lesão das estruturas ligamentares que circundam a articulação.
- B) O Enfermeiro, ao examinar o cliente, deve fazer inspeção e palpação, investigando hematomas, lesões cortantes, perfurantes, desalinhamentos dos membros, exposição óssea e sangramentos.
- C) O Enfermeiro deve desconsiderar a queixa do paciente em relação à dor intensa na proeminência óssea, pois ela resulta obrigatoriamente da imobilização por aparelho gessado.
- D) A entorse do tornozelo é uma lesão dos tecidos moles, produzidas por uma força contundente, do tipo queda.
- E) A distensão é uma afecção na qual as superfícies articulares dos ossos, que formam a articulação, deixam de estar em contato anatômico.

**19. A Resolução COFEN-272/2002, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE nas Instituições de Saúde Brasileiras, estabelece que a consulta de Enfermagem é**

- A) exclusiva do Enfermeiro.
- B) composta pela prescrição médica.
- C) substitutiva da consulta médica.
- D) delegada ao técnico de enfermagem.
- E) realizada apenas na pré-consulta médica.

**20. Para transformar 500 ml de Soro Glicosado a 5% em Soro Glicosado a 10%, o serviço dispõe de ampolas de glicose 20ml a 50%. O Enfermeiro deve acrescentar**

- A) 30,5 ml de glicose a 50% em frasco de 500 ml de SG 5%.
- B) 35,5 ml de glicose a 50% em frasco de 500 ml de SG 5%.
- C) 55,5 ml de glicose a 50% em frasco de 500 ml de SG 5%.
- D) 100 ml de glicose a 50% em frasco de 500 ml de SG 5%.
- E) 25 ml de glicose a 50% em frasco de 500 ml de SG 5%.

**21. A avaliação de pacientes com distúrbios pulmonares deve, dentre outros, compreender**

- A) o Exame do tórax que pode compreender quatro tipos principais de deformidades, sendo o tórax de pombo a deformidade mais comum, que ocorre devido à elevação da escápula comprimindo o coração e os grandes vasos causando sopros.
- B) a observação da frequência respiratória e da profundidade da respiração, sendo esta importante para determinar o padrão respiratório do paciente. Se há aumento na frequência e na profundidade da respiração, haverá aumento da PCO<sub>2</sub> arterial.
- C) a palpação que faz parte do exame do torax e onde achados referentes à não-apresentação do frêmito tátil, podendo esta determinar a consolidação de um lobo pulmonar devido à pneumonia.
- D) a percussão que movimentada a parede torácica e as estruturas adjacentes, produzindo vibrações audíveis e táteis pode determinar um som maciço, chamado de macicez pulmonar, que se apresenta quando o parênquima cheio de ar é substituído por líquido ou tecido sólido.
- E) a ausculta dos sons respiratórios para determinar as condições dos pulmões que podem evidenciar ruídos musicais e contínuos chamados de creptações que aparecem em decorrência da asma e do acúmulo de secreção.

**22. A Insuficiência Renal (IR) ocorre quando os rins são incapazes de remover as escórias metabólicas do corpo ou realizar funções reguladoras. Sobre esta afecção, assinale a alternativa correta.**

- A) Na Insuficiência Renal Aguda (IRA), independente do volume de urina excretado, o paciente apresenta elevação dos níveis séricos de creatinina e nitrogênio úrico sanguíneo e retenção de outros produtos metabólicos normalmente excretados pelo rim.
- B) Depleção de volume, vasodilatação e comprometimento da performance cardíaca se encontram dentro da categoria de distúrbios pós-renal, que causam a IRA.
- C) Dentre as fases clínicas da IRA, o período de diurese é acompanhado por elevação da concentração sérica de elementos excretados pelos rins.
- D) As causas intra-renais da IRA estão relacionadas à obstrução em algum ponto distal do rim e podem ser causadas por cálculos, tumores e coágulos sanguíneos.
- E) Dentre as manifestações clínicas da IRA, encontra-se a anemia causada principalmente pelo aumento da produção de eritropoetina pelos rins.

**23. O objetivo do cuidado de enfermagem, na assistência ao cliente no pós-operatório imediato, ainda na sala de recuperação anestésica, em prevenir choque e hipóxia, é aferir e avaliar frequentemente**

- A) presença de febre e dor, infusão venosa e cicatrização da ferida.
- B) ventilação pulmonar, sinais vitais, funcionamento de tubos, drenos, cateteres e infusões.
- C) capacidade de deambulação, pulso e temperatura, capacidade pulmonar com exercício respiratório.
- D) volume urinário, pressão venosa central e cicatrização da ferida.
- E) capacidade de deambulação, funcionamento da infusão venosa, cicatrização da ferida e capacidade pulmonar com exercício respiratório.

**24. M.S, 40 anos, sexo feminino, ao exame físico, foram detectados nódulos na tireóide. Após investigação criteriosa foi indicada tireoidectomia para retirada de nódulos não cancerosos. Quanto aos cuidados no pós-operatório, assinale a alternativa correta.**

- A) A posição dorsal é indicada como a mais confortável para paciente no pós-operatório tardio.
- B) Os curativos cirúrgicos devem ser avaliados periodicamente; queixa de plenitude e sensação de pressão no local da incisão podem indicar curativos compressivos.
- C) O paciente deve ser estimulado a falar o máximo e mais precocemente possível com o objetivo de evitar danos ao nervo laringeal recorrente.
- D) É indicada alimentação saudável e balanceada composta por dieta leve ou líquida oferecida sempre quente.
- E) Hiperirritabilidade dos nervos com espasmos das mãos, pés e torções musculares é chamado de tetania, complicações pós-operatória, devido à queda do nível sanguíneo de cálcio.

**25. De acordo com a classificação do Ministério da Saúde, para áreas e artigos hospitalares, associe a segunda coluna de acordo com a primeira.**

- |                         |     |   |
|-------------------------|-----|---|
| 1. Artigos críticos     | ( ) | Papagaios, bacias, tensiômetros e estetoscópios.                                  |
| 2. Artigos semicríticos | ( ) | Sala de espera, elevadores e corredores.  |
| 3. Artigos não-críticos | ( ) | Enfermarias, salas de exames, ambulatórios.                                       |
| 4. Áreas semicríticas   | ( ) | Sala de parto, unidade de queimado.   |
| 5. Áreas críticas       | ( ) | Instrumentais cirúrgicos, Nutrição Parenteral Total e campos cirúrgicos.          |
| 6. Áreas não-críticas   | ( ) | Sonda Vesical de demora, equipamentos de assistência ventilatória e broncoscópio. |

**Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.**

- A) 2, 3, 1, 4, 5, 6.
- B) 3, 2, 1, 4, 6, 5.
- C) 3, 6, 4, 5, 1, 2.
- D) 6, 5, 3, 2, 1, 4.
- E) 4, 2, 5, 1, 3, 6.

CONCURSO PÚBLICO

26. Considerando que a imunização representa uma das mais eficazes ações básicas na promoção da saúde, atitude fundamental para melhorar as condições de saúde na infância, em relação as suas indicações e contra-indicações, assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F, para as Falsas.

- ( ) A administração de vacinas está contra-indicada para crianças desnutridas, baixo peso ao nascer e prematuridade.  
( ) A criança em uso prévio ou em andamento de vacina anti-rábica pode ser vacinada normalmente.  
( ) Nas crianças com SIDA, a proteção contra pólio deverá ser feita com a vacina SALK (vírus inativados).  
( ) A aplicação da BCG não é recomendada em crianças com peso inferior a 2Kg e nas crianças imunodeficientes.  
( ) As crianças sensíveis ao componente Pertusis (P) da DPT devem receber a vacina DT tipo infantil até os 6 anos e 11 meses de idade.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- A) V, F, V, V, V.                      B) F, V, V, F, V.                      C) V, V, F, V, V.                      D) V, V, V, V, V.                      E) F, V, V, V, V.

27. O crescimento e o desenvolvimento são processos geneticamente programados, embora dependentes de fatores individuais e ambientais que possam afetar positiva ou negativamente seu curso. Em relação ao crescimento e desenvolvimento puberal, é correto afirmar que

- A) no sexo masculino, o aumento do volume dos testículos ocorrerá como a última manifestação da puberdade, apresentando-se como Critério de Tanner P2.  
B) a duração de ginecomastia puberal, evento temporário que pode ocorrer em cerca de 2/3 dos meninos, varia de 5 a 10 anos.  
C) as alterações do epitélio vaginal constituem no sexo feminino a primeira manifestação da ação estrogênica.  
D) o estadiamento puberal do sexo masculino, segundo os critérios de Tanner G2, está relacionado com o aumento do pênis, inicialmente em toda a sua extensão.  
E) o estadiamento puberal do sexo feminino, segundo os critérios de Tanner M5, está relacionado à fase pré-adolescência (elevação das papilas).

28. A sonda nasogástrica (SNG) é utilizada para minimizar e/ou solucionar situações clínicas apresentadas pelo paciente. Para a instalação e o controle deste dispositivo, o enfermeiro deve

- I. identificar as causas para instalação de SNG, quais sejam, remover líquidos e gases do trato gastrointestinal superior, obter amostra do conteúdo gástrico para estudo laboratorial, administrar medicamento e alimentos através da sonda.  
II. reconhecer que as marcas circulares encontradas em pontos específicos da sonda são usadas como guia para sua inserção, dispensando a medição que vai da ponta do nariz ao lobo da orelha e deste ao apêndice xifóide.  
III. para verificar o posicionamento correto da SNG, realizando o seguinte teste: conectar a seringa e a sonda, aspirando suavemente, a fim de obter o conteúdo gástrico.  
IV. reconhecer que, para administrar medicação ou alimentação pela SNG, é necessário verificar o posicionamento adequado da sonda assim como administrar água para, através dela, evitar obstrução por resíduos alimentares.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, III e I apenas.                      B) I, II e IV apenas.                      C) II e III apenas.                      D) II, III e IV apenas.                      E) apenas a II.

29. J.R., 60 anos, sexo masculino, foi admitido na emergência de um hospital com o quadro de incontinência urinária por nefropatia diabética. Diante do quadro, foi prescrito cateterização da bexiga de demora. Para realizar o procedimento, o enfermeiro deve

- A) avaliar o paciente, realizando exame físico, a fim de determinar o calibre da sonda a ser instalada, que, para homens, varia de 12 a 18.  
B) adotar, para realização do procedimento, técnica rigorosa de assepsia, utilizando circuito aberto de drenagem, evitando, assim, presença de microorganismos na luz do cateter.  
C) realizar higiene perineal antes da introdução do cateter, que, no homem, deve ocorrer, retraindo o prepúcio, iniciando a higiene pelo meato uretral, avançando pelo corpo do pênis através de movimentos unidirecionais.  
D) utilizar lubrificante sobre a superfície da ponta do cateter, preferencialmente vaselina, por ser lipossolúvel, aplicando no homem, pelo menos, 15 cm da sonda.  
E) verificar a integridade do balão da SVD, injetando PVP-I, por ser uma substância antisséptica, impedindo, assim, o risco de infecção.

30. Com relação à assistência em saúde mental, é correto afirmar.

- A) Os CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) são hospitais de pequeno porte para atendimento de pacientes oriundos dos hospitais de grande porte.  
B) CAPS são unidades de saúde não regionalizadas do nível secundário.

CONCURSO PÚBLICO

- C) Os CAPS oferecem atendimento de cuidados intermediários e devem funcionar 24 horas por dia, durante sete dias.  
D) Nos CAPS, a equipe mínima é formada por: médico, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta e assistente social.  
E) Os critérios de hierarquização e regionalização da rede são definidos pela equipe médica.

**31. A maioria das feridas cicatriza sem problemas, porém podem ocorrer fatores internos e externos que afetam a cicatrização, e a infecção pode ser um deles. Quanto a este dado, assinale a alternativa correta.**

- A) O idoso apresenta as mesmas possibilidades que o jovem para o risco de infecção nos vários tipos de ferida, pois a produção de colágeno através dos fibroblastos é fisiológica e independe da idade.  
B) A obesidade aumenta o índice de infecção na ferida limpa, aparecendo numa ampla gama de casos cirúrgicos.  
C) Não há relação entre o déficit do estado nutricional e o risco de infecção, pois o empobrecimento protéico não influencia a produção dos neutrófilos.  
D) O tempo aumentado de permanência no hospital possibilita um melhor acompanhamento da ferida, não interferindo no índice de infecção.  
E) Irradiação, esteróides e drogas imunossupressoras não interferem na produção de fibroblastos, conseqüentemente, de colágeno e glóbulos brancos.

**32. O Diabetes Mellitus é um grupo de distúrbios heterogêneos caracterizados por níveis elevados de glicose. Diante desta afirmativa, assinale a alternativa correta.**

- A) O Diabetes Tipo I é identificado pela resistência à insulina, que provoca maior degradação de gorduras e aumento dos corpos cetônicos.  
B) É considerada hipoglicemia quando os níveis de glicose sanguínea estiverem abaixo de 50 e 60 mg/dl, podendo o paciente apresentar sintomas, como: suor, tremor, taquicardia, palpitação, dormência, fala confusa, descordenação, alteração emocional e de comportamento, podendo chegar à inconsciência.  
C) Ao atender o paciente diabético com sinais de hipoglicemia, glicemia capilar < ou igual a 140mg/dl, independente do nível de consciência, administrar glucagon por via subcutânea.  
D) As complicações microvasculares, macrovasculares, retinopatia diabética, nefropatia, neuropatia diabética e pé diabético ocorrem nos diabéticos tipo I, por serem mais graves.  
E) Em pacientes diabéticos, a verificação dos pulsos periféricos é importante para o controle da pressão arterial que se mantém sempre abaixo dos níveis tensionais normais.

**33. O automonitoramento do cliente portador de Diabetes Mellitus em tratamento pode ser acompanhado através da**

- A) Cetonúria.      B) Glicemia plasmática.      C) Glicemia Capilar.      D) Proteinúria.      E) Gliocósúria.

**34. Sobre AIDS, leia as sentenças abaixo.**

- |  |
|--|
| <p><b>I.</b> As DST são o principal fator facilitador da transmissão sexual do vírus da AIDS, pois feridas nos órgãos genitais favorecem a entrada do HIV.</p> <p><b>II.</b> Na infecção precoce pelo HIV, também conhecida como fase assintomática, o estado clínico básico é mínimo ou inexistente. Alguns pacientes podem apresentar uma linfadenopatia generalizada persistente, "flutuante" e indolor.</p> <p><b>III.</b> A fase assintomática do processo de infecção pelo HIV é caracterizada pelos seguintes processos oportunistas: úlceras aftosas, diarreia, sinusopatias, herpes simples recorrente e herpes zoster.</p> <p><b>IV.</b> As infecções oportunistas podem ser causadas por microrganismos não considerados usualmente patogênicos, ou seja, que não são capazes de desencadear doença em pessoas com sistema imune normal; as doenças oportunistas associadas à AIDS são várias, podendo ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, fungos e certas neoplasias.</p> |
|--|

**Estão corretas as afirmativas**

- A) I, II, III e IV.      B) I, III e IV.      C) I e IV.      D) I, II e IV.      E) II, III e IV.

**35. Consideramos envelhecimento como um processo biológico básico aquele que começa com a concepção e finda com a morte. Trata-se de um fenômeno normal, fisiológico, comum a todos os seres vivos. Sobre as alterações normais do Processo de Envelhecimento, leia as sentenças abaixo.**

- |   |
|---|
| <p><b>I.</b> Redução da capacidade vital e capacidade pulmonar total, volume residual aumentado, ventilação diminuída.</p> <p><b>II.</b> As alterações morfológicas ocorridas no coração têm como resultado: redução da força contrátil e uma fibrose miocárdica.</p> <p><b>III.</b> A compressibilidade está aumentada na pele idosa, provavelmente causada pelo maior conteúdo d'água.</p> <p><b>IV.</b> Redução da atividade auditiva para freqüências mais elevadas e aumento da sensibilidade para ruídos altos são características da presbiacusia.</p> |
|---|

Está(ão) correta(s)

- A) apenas a I.            B) apenas I, II e IV.            C) apenas I e IV.            D) apenas II e III.            E) apenas II, III e IV.

**36. Quando uma gestante é admitida em um serviço de urgência com diagnóstico de placenta prévia com hemorragia, devem ser avaliados os seguintes dados:**

- A) tipo de placenta prévia, idade gestacional, ocorrência do trabalho de parto e intensidade da hemorragia.  
B) tipo de placenta prévia, idade gestacional, ocorrência do trabalho de parto, hemorragia e presença de infecção.  
C) tipo de placenta prévia, cefaléia, ocorrência do trabalho de parto e hemorragia.  
D) tipo de placenta prévia, idade gestacional, dor em baixo ventre, e hemorragia.  
E) tipo de placenta prévia, idade gestacional, intensidade da hemorragia e, principalmente, condição fetal.

**37. J.A.C deu entrada em uma Maternidade, no dia 20/09/2006, com sinais e sintomas de trabalho de parto ativo. Ao ser interrogada pelo plantão médico, informou não saber a data da última menstruação (DUM). Foi mensurada altura de fundo de útero (AFU), que foi igual a 34cm. Nesse caso, a idade gestacional é**

- A) 38 semanas e 6 dias.  
B) 39 semanas e 6 dias.  
C) 39 semanas e 2 dias.  
D) 40 semanas e 6 dias.  
E) 38 semanas e 4 dias.

**38. Paciente sexo masculino, 40 anos, servente de obra. Vem ao ambulatório com queixa de mancha dormente na pele, há mais de seis meses. Nega dor ou prurido, queixando-se de leve e ocasional formigamento no local. Ao exame, foi localizada, na face posterior e interna da mão direita, lesão hipocrômica única com limites externos imprecisos e alteração da sensibilidade. Que doenças você poderia lembrar com esses dados?**

- A) Pityriase Versicolor.  
B) Eczemóide.  
C) Hanseníase.  
D) Tuberculose cutânea.  
E) Dermatite de contato.

**39. Em um país endêmico como o Brasil, um caso de hanseníase pode ser definido, quando uma pessoa apresenta uma ou mais das seguintes características e requer quimioterapia:**

- A) lesões de pele há mais de 12 meses, com ou sem alteração de sensibilidade, exame de baciloscopia normal.  
B) dormência nos nervos; formigamento nas mãos e pés e mal perfurante plantar.  
C) lesão (ões) de pele com alteração de sensibilidade; acometimento de nervo (s), com espessamento neural; baciloscopia positiva.  
D) o espessamento neural é o mais importante achado na definição de um caso de hanseníase.  
E) o mais importante achado na definição de um caso de hanseníase é a baciloscopia negativa.

**40. J.J.S, desempregado, com tuberculose pulmonar confirmada, retorna ao serviço, após ter abandonado o Esquema I para tuberculose (abandonou o esquema, com 25 dias de tratamento). Abaixo, qual esquema de tratamento deverá ser utilizado pelo paciente após esse episódio?**

- A) 2 meses de Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida + 4 meses de Rifampicina, Isoniazida e Etambutol.  
B) 2 meses de Rifampicina, Isoniazida, Etambutol e Pirazinamida + 4 meses de Rifampicina, Isoniazida e Etambutol.  
C) 2 meses de Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida + 7 meses de Rifampicina, Isoniazida.  
D) 3 meses de Estreptomicina, Pirazinamida, Etambutol e Etionamida + 9 meses de Etambutol e Etionamida.  
E) 2 meses de Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida + 4 meses de Rifampicina, Isoniazida.