

SECRETARIA DE SAÚDE DE PERNAMBUCO  
PROCESSO SELETIVO À RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  
EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE

**DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO**

*Não deixe de preencher as informações a seguir:*

<i>Prédio</i>																				<i>Sala</i>									

<i>Nome</i>																																								

<i>Nº de Identidade</i>								<i>Órgão Expedidor</i>				<i>UF</i>		<i>Nº de Inscrição</i>																									

<p align="center"><b>GRUPO 22 – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO- MAXILO-FACIAL</b></p>
--



**01. Em relação à terapêutica farmacológica, utilizando os anti-inflamatórios não esteroides (AINE), assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Os inibidores da COX-2 apresentam um efeito gradativo nos efeitos colaterais gastrointestinais, principalmente no que se refere ao perigo de surgimento de úlceras gástricas.
- B) A COX-2 é responsável pela produção de prostaglandinas num tecido inflamado e, portanto, é abundantemente produzida em condições fisiológicas.
- C) A COX-1 é a enzima constitutiva constantemente presente, em níveis baixos, na maior parte dos tecidos: regula as atividades celulares normais e o funcionamento renal e exerce uma função de proteção gástrica.
- D) Os AINE clássicos são substâncias alcalinas, pelo que sua absorção diminui com o pH neutro. Esse fato é importante na relação à absorção dos AINE no estômago e à sua biodisponibilidade;
- E) Dentre os fármacos inibidores da COX-2, têm-se o rofecobix, o celecoxib, a indometacina, o meloxicam, entre outros.

**02. Sobre os acessos à região apical, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A incisão de Portland é realizada em nível da papila e está indicada para cirurgia de lesões localizadas em nível cervical.
- B) A incisão de Wustrow ou Portland é aquela na qual a incisão horizontal é feita em nível de gengiva inserida e está indicada para lesões localizadas em nível apical, sendo que, no local da incisão vertical, estão as estruturas anatômicas que não podem ser seccionadas.
- C) A incisão de Wassmunn compõe-se de uma incisão horizontal e de duas verticais, sendo o traçado horizontal subgengival.
- D) A característica da incisão de Luebke é que o traçado vertical é paralelo, e o horizontal é reto, acima das papilas.
- E) As incisões de Portland, de Wasmudl e de Partsh para acesso radicular não devem ser usadas em cirurgias paraendodônticas.

**03. Assinale a afirmativa INCORRETA em relação ao momento de se fazer a divulsão em cirurgias buco-dentais.**

- A) Divulsionar cuidadosamente.
- B) Evitar romper o retalho.
- C) Manter o retalho afastado cuidadosamente.
- D) Posicionar os afastadores apoiados na mucosa e nunca no osso.
- E) Utilizar o retalho dividido.

**04. Nas cirurgias apicais, em que a obturação retrógrada pode ser indicada, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Canais inacessíveis em dente que apresenta lesão apical.
- B) Raiz curta
- C) Dentes com prótese e pino
- D) Instrumentos fraturados
- E) Perfurações

**05. Em relação a Fármacos, assinale a afirmativa CORRETA.**

- A) Quando se prescreverem as benzilpenicilinas (penicilina G), para melhor absorção, a via de escolha é a enteral.
- B) A absorção dos fármacos consiste em uma transferência do local de aplicação até alcançar a corrente circulatória.
- C) A grandeza dos efeitos dos fármacos independe do grau de absorção.
- D) Devido à sua alta toxicidade, as tetraciclina devem ser ingeridas sempre com leite.
- E) A farmacocinética abrange movimentos dos fármacos, exclusivamente quanto à sua biotransformação.

**06. Segundo Pallasch, os principais fatores relacionados ao insucesso da terapia antimicrobiana são todos abaixo, EXCETO:**

- A) Escolha inapropriada do antibiótico.
- B) Falha do cálculo da dosagem.
- C) Antibiótico capaz de penetrar no sítio de infecção.
- D) Antagonismo entre antibióticos.
- E) Fatores locais desfavoráveis.

**07. Sobre infecções, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A principal etiologia das infecções orofaciais é oportunista via contaminação hematogênica.
- B) A natureza das infecções odontogênicas é polimicrobiana. As bactérias da infecção odontogênica, embora coexistam no hospedeiro, não são nativas da cavidade bucal.
- C) A dacriocistite pode ser um dado clínico de propagação da infecção pelo espaço canino.
- D) A homeostase determina o desequilíbrio entre o hospedeiro e o organismo patogênico.
- E) Os abscessos correspondem a estágios agudos das infecções com edema difuso e cavidade delimitada e com dor localizada.

**08. Sobre Adenoma, assinale a afirmativa CORRETA.**

- A) Os adenomas pleomórficos reagem bem ao tratamento quimioterápico.
- B) Nos adenomas pleomórficos localizados no lobo profundo da parótida, a enucleação é a melhor opção.
- C) A enucleação deve ser a orientação cirúrgica em todos os casos de adenomas localizados na parótida.
- D) Nas lesões localizadas no lobo superficial da glândula parótida, é recomendada parotidectomia superficial.
- E) A enucleação local tem prognóstico de cura de 95%, evitando a recorrência.

**09. Nas alveoloplastias, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Nos casos graves de protusões alveolares, segundo Olwegeses, as fraturas ósseas devem acontecer nas corticais labial e palatina.
- B) As fraturas intrasseptais não interferem nas excessivas reabsorções ósseas alveolares.
- C) Nas alveoloplastias, a conservação de osso é dispensável.
- D) Nunca deve ser feita alveoloplastia em rebordos residuais da maxila.
- E) Os tecidos ósseos que são reabsorvidos, embora estejam irregulares, não devem ser submetidos a técnicas de alveolectomias.

**10. Em relação aos tumores odontogênicos, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Apenas os achados histopatológicos não podem diferenciar as lesões neoplásicas das anomalias de desenvolvimento. As características clínicas e radiográficas são de auxílio considerável no processo de diferenciação.
- B) O fibroma ameloblástico é um tumor de origem nesenquimal, incomum que acomete mais pacientes entre a quinta e a sexta década de vida.
- C) Os fibro-odontomas ameloblásticos ocorrem com igual frequência, na maxila e na mandíbula. Acometem mais o sexo feminino que o masculino com proporção de 3:1.
- D) O fibro-odontoma ameloblástico geralmente é tratado por ressecção em bloco, devido à sua alta recorrência.
- E) O fibroma odontogênico periférico pode ser confundido, microscopicamente, com o ameloblastoma multilocular.

**11. Qual dos casos abaixo predispõe à fratura radicular de ordem técnica?**

- A) Anquilose da raiz dentária
- B) Hiperцемитose
- C) Osso denso ou esclerótico
- D) Raízes largas e delgadas
- E) Movimentos rotatórios em dentes multiradiculares

**12. Assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A cicatrização em um alvéolo dental ocorre por segunda intenção.
- B) Imediatamente após a extração do dente do alvéolo, o sangue preenche o espaço alveolar.
- C) Os processos de coagulação são ativados, e a malha de fibrina sela os vasos sanguíneos rompidos.
- D) A cicatrização ocorrerá quando a restituição tecidual acontecer sem destituição estrutural e funcional do tecido de origem. No alvéolo, a cicatrização não depende do tecido lesado.
- E) A organização do coágulo inicia-se dentro das primeiras 24-48 horas, com aumento e dilatação dos vasos sanguíneos, dentro dos remanescentes do ligamento periodontal.

**13. Segundo T. J. Zaydon e J. B. Brown, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A fixação interna com fios tipo Kirschner ou Steinman através de uma fratura proporciona um meio sólido e direto de imobilização mandibular.
- B) Os fios só devem ser transfixados intracanal mandibular.
- C) Não deve ser usado mais de um fio nas fraturas mandibulares.
- D) As transfixações não devem ser feitas através dos focos da fratura.
- E) Não se recomenda o uso de fios em mandíbulas edêntolas.

**14. Sobre bioética: no tocante à tensão entre os princípios, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Nem o princípio do consentimento nem o da beneficência é justificado em termos de suas consequências.
- B) Os princípios do consentimento revelam áreas inevitáveis de condutas coletivas.
- C) São princípios deontológicos: sua correção não é definida ou justificada em termos de suas consequências.
- D) Em contraste, as aplicações concretas do princípio do consentimento são obrigatórias, mesmo quando têm consequências negativas para a liberdade.
- E) O princípio do consentimento, justificável em termos da moralidade, do respeito mútuo, não se concentra na liberdade como valor, mas, nas pessoas como fonte de autoridade moral secular geral.

**15. Sobre bioética, na reescritura dos mandamentos, a nova perspectiva ética será, segundo P. Singer, todas as alternativas abaixo, EXCETO:**

- A) Reconheça que o valor da vida humana é variável.
- B) Assuma a responsabilidade pelas consequências de suas decisões.
- C) Respeite o desejo do outro de viver ou morrer.
- D) Só traga ao mundo filhos desejados.
- E) Trate toda vida humana como se fosse mais valiosa que qualquer vida não humana.

**16. Qual das situações clínicas abaixo determina cirurgia aberta para a redução do deslocamento nas fraturas da região condilar?**

- A) Possibilidade de redução do deslocamento e estabelecimento da oclusão
- B) Deslocamento extracapsular lateral do côndilo
- C) Deslocamento lateral do côndilo sem travamento
- D) Fratura retromandibular
- E) Fratura subcondilar e da apófise coronoide

**17. Qual das afirmativas abaixo está INCORRETA?**

- A) A neuropraxia é a lesão nervosa que resulta em déficit de condução nervosa, sem degeneração do axônio ou da bainha.
- B) Disestesia é uma sensação normal e desagradável, produzida por um estímulo normal.
- C) Hiperalgisia é uma resposta exacerbada a um estímulo moderadamente doloroso.
- D) A neurotmeze é a lesão nervosa com rompimento do axônio e da bainha, produzindo a degeneração walleriana e provável neuroma.
- E) Analgesia é a ausência de dor em resposta a um estímulo, que seria normalmente doloroso.

**18. Qual das predições radiográficas abaixo NÃO identifica uma provável relação do terceiro molar com o canal mandibular?**

- A) Escurecimento das raízes
- B) Estreitamento da raiz próximo ao canal
- C) Interrupção dos contornos do canal
- D) Desvio do curso normal do canal
- E) Retenção associada à hipercementose

**19. Assinale a alternativa que indica o tumor benigno mais comum das glândulas salivares.**

- A) Carcinoma mucoepidermoide
- B) Mucocele
- C) Adenocarcinoma
- D) Granuloma piogênico
- E) Adenoma pheomórfico

**20. Durante a cirurgia de tumores mandibulares agressivos recidivantes, como se pode avaliar as margens da ressecção durante a remoção?**

- A) Percepção da cor e sangramento das estruturas residuais
- B) Biópsia por congelamento
- C) Uso de crioterapia
- D) Aplicação de substâncias esclerosantes
- E) Curetagem até perceber dureza medular

**21. Qual dessas incidências permite melhor imagem da região submassetérica, detecção de má formação óssea?**

- A) Pósterio-anterior de mandíbula
- B) Occipitomentual 30°
- C) Pósterio-anterior do crânio
- D) Towne reversa
- E) Pósterio-anterior rotacionada da face

**22. A remoção dos terceiros molares inclusos e/ou impactados é aconselhável**

- A) em pacientes cujos terceiros molares são julgados que podem entrar em erupção com sucesso e têm um papel funcional na dentição.
- B) nos doentes cujo histórico médico torna a remoção um risco inaceitável para a saúde geral do paciente ou onde o risco ultrapasse o benefício.
- C) em pacientes com terceiros molares impactados profundamente, sem história ou evidência de patologia pertinente local ou sistêmica.
- D) em pacientes que estão experimentando ou sofrendo infecção significativa associada a terceiros molares impactados.
- E) em pacientes em que o risco de complicações cirúrgicas é julgado ser inaceitavelmente elevado ou onde a fratura de uma mandíbula atrófica pode ocorrer.

**23. Quais são os itens que devem ser avaliados no paciente politraumatizado para a classificação da escala de coma de Glasgow?**

- A) Abertura ocular, pressão arterial e padrão respiratório.
- B) Pulso, frequência respiratória, batimento cardíaco.
- C) Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora.
- D) Hemorragia, pressão arterial, reflexo pupilar.
- E) Lesão coluna, hemorragia, resposta motora.

**24. Assinale a alternativa que contém a característica química da Lidocaína.**

- A) Cloridrato de 2-propelamino-o-propionotoluidina.
- B) Cloridrato de 2-dietilamino-2; 6-acetoxilidida.
- C) Cloridrato de 1-metil-2, 6-pipecoloxilidina.
- D) Cloridrato de 3-n-propilamino-2-carbometox-4-metiltiofeno.
- E) Cloridrato de 1-metil-4 metil tiofeno.

**25. Fio de sutura ideal teria como características básicas:**

- A) capilaridade, inerte aos tecidos, flexível.
- B) pouco elástico, não-carcinogênico, não capilar.
- C) inerte aos tecidos, capilaridade, flexível.
- D) inflexível, inerte aos tecidos, não alérgico.
- E) metálico, vegetais, algodão.

**26. Nas fraturas ósseas, o reparo do tecido ósseo obedece a uma ordem histogênica e**

- A) a histogênese óssea acontece por ossificação por 1ª e 2ª intenção, formando osso histologicamente diferente.
- B) osso, como tecido mineralizado, 25% e 75% orgânico, organiza seu reparo com cálcio, fósforo e sódio.
- C) ossificação intramembranosa ou ossificação endocondral, ambas formando osso histologicamente idêntico.
- D) a presença de células de colágeno tipos I, III e de proteoglicanos define a ordem de reparação.
- E) a histogênese óssea se processa, independente das células osteogênicas, do periósteo e do endósteo, respectivamente.

**27. Para a realização de exodontias, os fórceps**

- A) nº 53 se aplicam aos caninos e incisivos superiores.
- B) nºs 18 3 53 se aplicam aos 3ºs molares superiores.
- C) nºs 150 e 16 se aplicam aos molares inferiores.
- D) nºs 99 e nº 1 são usados para exodontias dos incisivos e caninos inferiores.
- E) nºs 222 e nº 65 são usados para pré-molares superiores e pré-molares inferiores.

**28. De acordo com a classificação de Pell e Gregory, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Se o diâmetro mesiodistal da coroa está completamente anterior ao bordo anterior do ramo mandibular, o dente está na relação classe III.
- B) Se o diâmetro mesiodistal da coroa está parcialmente coberto pelo ramo mandibular, o dente está na relação classe II.
- C) Se o diâmetro mesiodistal da coroa está completamente coberto pelo ramo mandibular, o dente está na relação classe I.
- D) A classe A ocorre quando a superfície oclusal do dente impactado encontra-se no mesmo nível ou próxima do nível do plano oclusal do segundo molar.
- E) A classe C, a superfície oclusal do dente impactado, está entre a linha cervical e o plano oclusal do segundo molar.

**29. Todos abaixo são fatores que dificultam a cirurgia dos terceiros molares, EXCETO**

- A) posição mesioangular.
- B) proximidade com o canal alveolar inferior.
- C) impaction óssea completa.
- D) raízes divergentes e curvas.
- E) posição distoangular.

**30. Todas são complicações durante a cirurgia dos terceiros molares, EXCETO**

- A) feridas causadas por abrasão.
- B) deslocamento radicular.
- C) fratura de restaurações de dentes adjacentes.
- D) cisto paradentário.
- E) fratura da tuberosidade.

**31. Todas são características da celulite facial, EXCETO**

- A) dor intensa e generalizada.
- B) presença de bactérias anaeróbicas.
- C) limites difusos.
- D) consistência pastosa à endurecida.
- E) evolução aguda.

**32. Nas infecções odontogênicas, os mecanismos de defesa do hospedeiro podem estar alterados. Assinale a alternativa que NÃO resulta em comprometimento das defesas do paciente.**

- A) Diabetes avançado
- B) Agentes quimioterápicos
- C) Leucemia
- D) Etilismo
- E) Hipertensão arterial

**33. Nas infecções dos espaços faciais, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) O espaço canino é um estreito espaço localizado entre os músculos zigomático maior e zigomático menor.  
 B) O espaço bucal é limitado pelos músculos bucinador no seu aspecto lateral e pelo músculo pterigoide medial no seu aspecto medial.  
 C) O espaço infratemporal localiza-se posteriormente à maxila. Medialmente, limita-se pela lâmina lateral do processo pterigoide do osso esfenóide e superiormente pela base do crânio.  
 D) O espaço submental localiza-se entre os ventres anterior e posterior do músculo digástrico.  
 E) Os espaços sublingual e submandibular são envolvidos, quando ocorre a perfuração vestibular da infecção a partir dos molares inferiores.

**34. A trombose do seio cavernoso é uma infecção séria, que constitui ameaça à vida, apresentando alta taxa de mortalidade. São vias de disseminação superior da infecção odontogênica, que podem resultar na trombose do seio cavernoso, EXCETO**

- A) plexo pterigoide.  
 B) veia angular.  
 C) veia oftálmica superior.  
 D) veia oftálmica inferior.  
 E) veia temporal profunda.

**35. Obstrução da via aérea superior e ruptura do abscesso com aspiração de pus para os pulmões e disseminação da infecção para o mediastino são potenciais complicações que podem envolver o(s) seguinte(s) espaço(s) facial(is):**

- A) Bucal.  
 B) Infratemporal.  
 C) Massetérico.  
 D) Temporal superficial e profundo.  
 E) Retrofaríngeo e/ou pré-vertebral.

**36. A osteotomia subapical total está indicada no caso de segmento dentoalveolar**

- A) protuído associado à má oclusão classe III.  
 B) protuído associado à má oclusão classe II.  
 C) retruído associado à má oclusão classe III.  
 D) retruído associado à má oclusão classe II.  
 E) extruído associado à má oclusão classe II.

**37. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna nele existente.**

“\_\_\_\_\_ é a redução do número de germes a um nível julgado isento de perigo. Sua aplicação é realizada em objetos, dependências hospitalares, refeitórios e lavanderias.”

- A) Desinfecção      B) Sanificação      C) Esterilização      D) Descontaminação      E) Antissepsia.

**38. A máscara facial, usada em cirurgias, é uma barreira, que deve promover proteção às vias aéreas. As máscaras mais recomendadas são as que apresentam 99,97% de eficiência contra partículas de 0,3mm. Qual dos materiais utilizados na fabricação das luvas é mais eficiente contra partículas de 0,3mm?**

- A) Fibra de Vidro      B) Algodão      C) Papel      D) Espuma      E) Polímero vegetal

**39. Em relação à técnica de degermação das mãos para procedimentos cirúrgicos, qual é o tempo mínimo ideal para a realização dessa técnica?**

- A) 2 min.      B) 3 min.      C) 4 min.      D) 5 min.      E) 6 min.

**40. A monitorização biológica é usada para comprovar a efetividade da esterilização. As tiras indicadoras são impregnadas com esporos. No processo de esterilização em autoclaves, qual é o esporo utilizado?**

- A) Bacillus stearothermophilus  
 B) Bacillus subtilis  
 C) Bacillus cereus  
 D) Bacillus anthracis  
 E) Bacillus megaterium

**41. Na avaliação pré-operatória, a frequência respiratória é determinada, fazendo-se a contagem da elevação e da descida do tórax do paciente durante 60 segundos. Qual é o parâmetro de normalidade do ritmo respiratório em adultos?**

- A) 12-22 resp/min.      B) 10-20 resp/min.      C) 18-24 resp/min.      D) 16-20 resp/min.      E) 18-25 resp/min.

**42. Com relação à osteotomia Le Fort I, todos abaixo são considerados movimentos estáveis, EXCETO**

- A) avanços de 10mm.  
 B) recuos de 8mm.  
 C) reposição superior de 10mm.  
 D) reposição inferior de 10mm.  
 E) expansão de 10mm.

**43. Sobre o tratamento cirúrgico da ATM, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Uma variedade de acessos cirúrgicos para a região temporomandibular é descrita, incluindo submandibular, intraoral, pré-auricular e por via endoscópica ou cirurgia videoassistida.
- B) Para a determinação do tipo de acesso cirúrgico a ser utilizado, considera-se o nível da localização da fratura bem como o grau de deslocamento dos fragmentos fraturados e o tipo de fixação escolhida.
- C) Tradicionalmente, fraturas na cabeça do côndilo ou situadas acima desse nível são melhor tratadas pelo acesso pré-auricular ou pelo endaural.
- D) O sistema de fixação mais utilizado no tratamento cirúrgico das fraturas condilares é o sistema 2,0mm.
- E) São indicação absoluta de tratamento cirúrgico as fraturas condilares bilateral de côndilo em pacientes edêntucos.

**44. Assinale a alternativa INCORRETA em relação às glândulas salivares.**

- A) As glândulas salivares são ausentes em peixes e cetáceos.
- B) As glândulas salivares maiores são responsáveis por 85% da saliva.
- C) A saliva produzida pela parótida é pouco fluida e contém pouca amilase.
- D) Os homens produzem um pouco mais de saliva que as mulheres.
- E) Células epiteliais, células do sangue, imunoglobulinas, íons e enzimas são encontradas na saliva.

**45. Assinale a alternativa cujo(s) termo(s) preenche(m) CORRETAMENTE a lacuna existente.**

*A dosagem bioquímica da saliva pode ser utilizada como método auxiliar para a avaliação de alterações, principalmente os níveis de \_\_\_\_\_.*

- A) imunoglobulinas
- B) cálcio
- C) proteínas
- D) cloretos
- E) sódio e potássio

**46. Na composição química do sialólito, qual é o componente com maior percentual?**

- A) Fosfato de cálcio
- B) Carbonato de cálcio
- C) Sais solúveis
- D) Substância orgânica
- E) Sulfato de sódio

**47. Sobre mordida de animais, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) As mordeduras provocadas por mamíferos são mais frequentemente causadas por cães.
- B) Nas mordeduras de seres humanos, os agentes mais frequentes são os *streptococcus spp.*
- C) *Pasteurellamultocida* pode ser encontrada em mordeduras por cães.
- D) O risco de infecção em qualquer tipo de mordedura é determinado pela localização da ferida, o tipo da lesão, etc.
- E) O uso de antibióticos está indicado quando algum dos fatores de risco para infecção está presente.

**48. Em relação às fraturas faciais, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) As fraturas nasais em “livro aberto” são comuns em crianças.
- B) A cerclagem consiste na colocação de um fio de aço inoxidável em torno do osso, para possibilitar maior função do referido osso.
- C) As cerclagens não podem ser usadas para estabilizar uma goteira.
- D) Duclos é um tipo de cerclagem utilizada na maxila.
- E) As bandagens de crepom de Gibson são utilizadas como tratamento definitivo nas fraturas de zigoma.

**49. Em qual dos casos abaixo, a osteotomia vertical intrabucal do ramo mandibular NÃO está indicada?**

- A) Grandes avanços mandibulares
- B) Recuos mandibulares
- C) Presença de DTM
- D) Prognatismo e face longa
- E) Prognatismo e face curta

**50. A análise de Bolton é a relação entre os dentes anteriores superiores e os inferiores. Qual é a proporção ideal?**

- A) A soma dos diâmetros mesiodistais dos incisivos e caninos superiores deve exceder em 20% a soma dos inferiores.
- B) A soma dos diâmetros mesiodistais dos incisivos e caninos superiores deve exceder em 30% a soma dos inferiores.
- C) A soma dos diâmetros mesiodistais dos incisivos e caninos superiores deve exceder em 40% a soma dos inferiores.
- D) A soma dos diâmetros mesiodistais dos incisivos e caninos superiores deve exceder em 45% a soma dos inferiores.
- E) A soma dos diâmetros mesiodistais dos incisivos e caninos superiores deve exceder em 50% a soma dos inferiores.



### **ATENÇÃO**

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos exigidos para a especialidade.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

**BOA SORTE!**