



**01. Paciente de 50 anos, sexo masculino relata, durante o atendimento odontológico, sensação de fraqueza, pés e mãos frios e náuseas. Observa-se, igualmente, palidez, sudorese intensa e alteração no ritmo cardíaco. O tratamento para o quadro clínico descrito consiste em,**

- A) com o paciente sentado, administrar broncodilatador em spray, administrar oxigênio e monitorar os sinais vitais.
- B) com o paciente em posição ereta, acalmá-lo verbalmente, fazê-lo respirar dentro de um saco plástico e monitorar os sinais vitais.
- C) com o paciente em posição supina, facilitar a circulação periférica, aplicar compressas frias, administrar oxigênio e estimular a respiração.
- D) com o paciente reclinado, administrar 0,4 mg de nitroglicerina por via sublingual, administrar oxigênio e monitorar pulso e pressão arterial.
- E) com o paciente sentado, interromper o atendimento odontológico, administrar vasodilatador e oxigênio.

**02. O quadro de concussão é definido como uma lesão traumática**

- A) das estruturas de suporte dos dentes com perda de substância dentária limitada ao esmalte e com pequeno grau de ruptura de ligamento periodontal.
- B) associada à leve intrusão sem ruptura do ligamento periodontal.
- C) caracterizada por intensa mobilidade e graves danos ao ligamento periodontal.
- D) das estruturas de suporte dos dentes, sem perda de substância, em que o trauma determinante não foi capaz de provocar a ruptura do ligamento periodontal.
- E) associada ao elemento dentário que sofreu leve extrusão e fratura da tábua óssea vestibular.

**03. Para que um Centro de Alta Complexidade em Oncologia exerça o papel auxiliar, de caráter técnico ao gestor do SUS, nas políticas de atenção oncológica, ele precisa**

- A) ser certificado pelo Ministério da Saúde ou pelo Ministério da Educação, de conformidade com a Portaria nº 1.000, de 15/4/2004.
- B) possuir dois Centros de Referência, se sua base territorial de atuação for para até 12.000 casos novos anuais.
- C) possuir três Centros de Referência, se sua base territorial de atuação for para mais de 12.000 até 24.000 casos novos anuais.
- D) possuir quatro Centros de Referência, se sua base territorial de atuação for para mais de 24.000 até 48.000 casos novos anuais.
- E) possuir cinco Centros de Referência, se sua base territorial de atuação for para mais de 96.000 casos novos anuais.

**04. “Com vistas a se diminuir o risco de instalação de um processo hemorrágico, procedimentos cirúrgicos orais não devem ser realizados com plaquetas abaixo de \_\_\_\_\_.”  
Assinale a alternativa cujo termo preenche CORRETAMENTE a lacuna.**

- A) 50.000/mm<sup>3</sup>
- B) 5.000/mm<sup>3</sup>
- C) 500.000/mm<sup>3</sup>
- D) 0,5000/mm<sup>3</sup>
- E) 5000.000/mm<sup>3</sup>

**05. Com relação aos acessos cirúrgicos, é INCORRETO afirmar que**

- A) em tecidos dilacerados, a cicatrização é mais demorada que em incisões cortantes.
- B) incisão relaxante deve estender-se desde dois dentes anteriores até um dente posterior à área da cirurgia.
- C) o retalho mucoso deve preservar o periósteo em posição durante o descolamento, para que, no retorno do tecido à posição original, haja o correto suprimento sanguíneo.
- D) a incisão relaxante em palato é quase sempre contraindicada, pois há o risco de se lesar a artéria palatina maior.
- E) no acesso cirúrgico ao osso palatino, está indicada a incisão em Y.

**06. Para um hospital ser credenciado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, ele deve, obrigatoriamente, contar com, no mínimo, serviços de**

- A) cirurgia oncológica e radioterapia.
- B) clínica oncológica e hematologia.
- C) cirurgia oncológica e oncologia clínica.
- D) cirurgia oncológica e oncologia pediátrica.
- E) oncologia clínica e oncologia pediátrica.

**07. Após traumatismo dentário, alguns cuidados devem ser tomados. Todos abaixo citados são cuidados que o dentista deve ter quanto ao tratamento imediato, EXCETO:**

- A) verificar a cobertura vacinal (antitetânica).
- B) prescrever bochecho com clorexidina a 0,12% duas vezes ao dia, por um minuto, durante 15 dias.
- C) recomendar o uso de analgésico, caso o paciente relate dor.
- D) Indicar o uso de anti-inflamatório nos casos em que haja deslocamentos dentários de maior severidade, como intrusão ou deslocamento lateral.
- E) Prescrever antibiótico.

**08. As facetas diretas de resina composta estão contraindicadas em**

- A) dentes tratados endodonticamente e com alteração e cor.
- B) dentes com amplas lesões de cárie envolvendo a face vestibular.
- C) dentes hipoplásicos.
- D) pacientes sem condições financeiras de receber um tratamento restaurador indireto.
- E) pacientes com hábitos parafuncionais.

**09. O número de Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e de Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia deve ser calculado por, no mínimo, cada 1.000 casos novos anuais, EXCETO para o câncer de**

- A) boca.
- B) pele.
- C) fígado.
- D) intestino.
- E) sangue.

**10. Paciente jovem, sistemicamente saudável apresenta ausência dos elementos 36, 46, 16; mobilidade grau II nos dentes 11, 12, 21, 22 e mobilidade grau III nos dentes 31 e 41. À sondagem, evidencia-se sangramento generalizado. Na anamnese, relata que a mãe e a avó materna apresentam o mesmo problema periodontal. Com base na descrição do caso clínico, o paciente apresenta, como possível diagnóstico,**

- A) periodontite crônica.
- B) doença periodontal necrotizante.
- C) periodontite como uma manifestação de doença sistêmica.
- D) periodontite agressiva.
- E) periodontite associada a lesões endodônticas.

**11. Evidências científicas mostram que o diabetes pode aumentar o risco de complicações periodontais pela**

- A) formação de AGEs (Produtos Finais de Glicosilação Avançada) e pela sua interação com os receptores de AGEs nos tecidos periodontais.
- B) diminuição da liberação de metaloproteinase da matriz pelos fibroblastos.
- C) diminuição dos níveis de interleucina 1-beta e prostaglandina E-2.
- D) liberação diminuída de citocinas pró-inflamatórias, levando a uma função imune alterada.
- E) maior quantidade de produção de colágeno pelos fibroblastos.

**12. Com relação ao manejo odontológico de paciente clinicamente comprometido, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Em pacientes com valvas cardíacas, sangramentos excessivos após procedimentos odontológicos invasivos podem acontecer como resultado da terapia a que são submetidos tais pacientes.
- II.** Petéquias bucais são manifestações patognomônicas em pacientes com endocardite infecciosa.
- III.** Atividades diárias, como escovação, utilização de fio ou uso de palitos de dentes, podem causar bacteremias.

**Está CORRETO, apenas, o que se afirma em**

- A) I e III.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) II.
- E) I.

**13. No tratamento da candidose mucocutânea crônica, a utilização de fluconazol pode acarretar a seguinte reação adversa:**

- A) melena.
- B) ansiedade.
- C) leucopenia.
- D) terror noturno.
- E) sonolência.

**14. A localização típica de alteração causada pela neutropenia cíclica é**

- A) soalho bucal.
- B) palato duro.
- C) região retromolar.
- D) bordo lateral da língua.
- E) amígdala palatina.

**15. Com relação ao manejo odontológico do paciente hipertenso, analise as afirmativas abaixo:**

- I. Dentre os efeitos colaterais relacionados à medicação anti-hipertensiva, estão a secura bucal e alteração do paladar.
- II. Em pacientes com hipertensão grave não controlada, procedimentos de rotina do tratamento odontológico podem resultar em infarto, angina ou AVC.
- III. O uso excessivo de vasoconstrictor em pacientes que fazem uso de betabloqueador não seletivo pode potencialmente causar queda abrupta da pressão sanguínea.

**Está CORRETO, apenas, o que se afirma em**

- A) I e III.
- B) II e III.
- C) I e II.
- D) II.
- E) III.

**16. Analise as afirmativas abaixo quanto ao tratamento odontológico de paciente com Alzheimer.**

- I. A tríade, aumento da ingestão de carboidratos, má higiene e xerostomia, pode ser a responsável pelo aumento de incidência de doença periodontal, cáries rampantes e radiculares nesses pacientes.
- II. Nos estágios iniciais da doença, o tratamento, odontológico é possível; por outro lado, em estágios mais avançados, as intervenções odontológicas são inviáveis devido às grandes complicações presentes.
- III. O profissional deve se manter atento aos sinais e sintomas bucais do paciente, que pode não relatar por incapacidade, como a recusa a alimentar-se ou escovar os dentes.
- IV. Pacientes em uso de ansiolíticos não devem ter a consulta marcada no horário de pico terapêutico da droga.

**Está INCORRETO o que se afirma em**

- A) I e II, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I, II, III e IV.
- D) I e III, apenas.
- E) II, apenas.

**17. Usualmente, pacientes com comprometimento do Sistema Nervoso Central (SNC) são impedidos de ficar bem acomodados na cadeira odontológica, necessitando, em virtude de seus problemas, de algum tipo de contenção ou estabilização. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Contenção física: é ergonômica e segura para paciente e cirurgião-dentista.
- B) Contenção com faixas e/ou lençol: sistema mais correto e seguro de contenção.
- C) Atendimento na cadeira de rodas: ergonomicamente é uma posição que só deve ser usada com pessoal auxiliar presente.
- D) O módulo estabilizador foi desenvolvido para dar mais conforto ao paciente e evitar anestesia geral, sendo composto de assento, dedeira e blusas.
- E) O uso de dedeiras no módulo de estabilização impede a união das arcadas dentárias, aumenta o campo e evita mordidas, facilitando o trabalho do cirurgião-dentista.

**18. Com relação à prevenção dos problemas que podem surgir quando do manejo odontológico de paciente clinicamente comprometido, analise as afirmativas abaixo:**

- I. A profilaxia antibiótica deve ser recomendada em todo e qualquer procedimento odontológico e para todo e qualquer paciente clinicamente comprometido.
- II. Para o adulto, a profilaxia antibiótica padrão consiste de dose única de 2 g de amoxicilina oral, de 30 a 60 minutos antes do procedimento.
- III. Em alérgicos à penicilina e impossibilitados de uso de medicação oral, está indicado o uso de ampicilina, cefazolina ou ceftriaxone intravenoso ou intramuscular.

**Está CORRETO, o que se afirma, apenas, em**

- A) I.
- B) II.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

**19. Dentre os problemas associados ao manejo de um paciente com insuficiência renal crônica, a terapia medicamentosa é extremamente relevante nos procedimentos odontológicos. Assinale a alternativa que apresenta a medicação que NÃO é removida pela diálise e necessita de dose suplementar após a hemodiálise.**

- A) Aspirina
- B) Clindamicina
- C) Amoxicilina
- D) Aciclovir
- E) Tetraciclina

**20. Pacientes diabéticos Tipo I ou Tipo II possuem características relevantes ao tratamento odontológico ambulatorial. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) As infecções dentárias agudas são mais difíceis de ser controladas em pacientes que fazem uso de altas dosagens de insulina.
- B) Pacientes com diabetes tipo I respondem melhor ao tratamento de infecções dentárias que aqueles com diabetes tipo II.
- C) A epinefrina 1:100.000, presente em anestésicos locais, apresenta efeito farmacológico análogo ao da insulina, promovendo diminuição do nível de glicose.
- D) Pacientes com diabetes controlada sem alteração sistêmica associada podem se submeter à cirurgia odontológica, mesmo sem profilaxia antibiótica.
- E) Pacientes diabéticos que apresentarem níveis glicosimétricos menores que 70 mg/dL estão aptos a realizar qualquer procedimento odontológico.

**21. Com relação à profilaxia antibiótica em paciente clinicamente comprometido, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Não está indicada nos sangramentos devido a trauma no lábio ou na mucosa oral.
- II.** Uma segunda dose pode ser indicada nas situações que envolvam vários atendimentos no mesmo dia ou se o procedimento durar de 4 a 6 horas.
- III.** O atendimento do paciente submetido à profilaxia antibiótica deve acontecer, preferentemente ou tanto quanto possível, dentro do período de sua cobertura.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) II, apenas.

**22. Em pacientes idosos, alérgicos à penicilina e com alto risco para endocardite bacteriana, profilaticamente se deve prescrever**

- A) cefalexina.
- B) ampicilina.
- C) fenoximetilpenicilina potássica.
- D) sulfa.
- E) vancomicina.

**23. A exérese de tórus mandibular na terceira idade está indicada para**

- A) prevenir a transformação maligna.
- B) evitar hemorragia espontânea.
- C) facilitar a adaptação de prótese total.
- D) possibilitar a superficialização do nervo mentoniano.
- E) melhorar a higienização bucal.

**24. Com relação ao paciente em tratamento para hipertensão, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Pré-medicação sedativa oral ou por inalação está recomendada na redução do estresse e ansiedade.
- II.** O uso de epinefrina deve ser limitado a, no máximo, três tubetes de 1:100.000 nos pacientes que estejam fazendo uso de betabloqueador não seletivo.
- III.** Em pacientes com hipertensão nível superior ao estágio 2, recomenda-se a suspensão do atendimento, se a PA alcançar 180/110.

**Está CORRETO, apenas, o que se afirma em**

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) II.
- E) III.

**25. Farmacologicamente em relação à insulina, a epinefrina possui**

- A) efeito oposto ao da insulina, de modo que a glicose pode aumentar com o seu uso.
- B) efeito semelhante ao da insulina, de modo que a glicose pode diminuir com o seu uso.
- C) efeito intensificador da insulina, diminuindo drasticamente os níveis de glicose com o seu uso.
- D) nenhum efeito sobre os níveis de glicose com o seu uso.
- E) efeito auxiliar no tratamento do paciente diabético com cetoacidose aguda.

**26. Qualquer paciente debilitado por longo período está sujeito a infecções agudas das glândulas salivares maiores. As glândulas mais comumente afetadas são**

- A) submandibulares.
- B) sublinguais.
- C) parótidas.
- D) acessórias.
- E) palatinas.

**27. Com relação ao atendimento de paciente com histórico recente (< 1 mês) de infarto do miocárdio, é CORRETO afirmar que**

- A) o tratamento odontológico eletivo deve ser evitado.
- B) sendo necessário o tratamento odontológico, os usos de anticolinérgicos, vasoconstrictores e de fio de retração gengival impregnado de epinefrina estão recomendados.
- C) é dispensável a avaliação dos sinais vitais pré-tratamento.
- D) em qualquer circunstância, é desnecessário que a consulta seja realizada na presença do médico clínico.
- E) nem mesmo tratamento de urgência deve ser realizado.

**28. O critério da ADA (1997) para o diagnóstico do diabetes mellitus é que ela está presente quando o nível sanguíneo da glicose em jejum estiver**

- A) 126mg / 100mL ou maior em duas ou mais ocasiões de testagem.
- B) 100mg / 150mL ou maior em duas ou mais ocasiões de testagem.
- C) 180mg / 150mL ou maior em três ou mais ocasiões de testagem.
- D) 70mg / 100mL ou menor em três ou mais ocasiões de testagem.
- E) 50mg / 70mL ou maior em duas ou mais ocasiões de testagem.

**29. Em pacientes com distúrbios hemorrágicos, as manifestações bucais mais comuns são**

- A) petéquias em superfícies mucosas e equimoses.
- B) xerostomia e leucoplasias.
- C) candidíase no dorso da língua e líquen plano.
- D) herpes zoster e herpes simples na mucosa labial.
- E) queilite angular e pêfigo vulgar.

**30. Com relação ao manejo odontológico de paciente com doença pulmonar, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Nas pessoas com asma de moderada a grave persistente, está recomendada a inalação profilática antes de cada procedimento.
- II.** Para anestesia desses pacientes, deve-se priorizar as soluções contendo sulfito.
- III.** Em pacientes fazendo uso de teofilina, estão recomendados, na profilaxia antibiótica, os antibióticos macrolídeos.

**Está CORRETO, apenas, o que se afirma em**

- A) I e III.
- B) I e II.
- C) III.
- D) II.
- E) I.

**31. Os problemas bucais causados pela modificação de outros tecidos, tais como a medula óssea, devido à ação de drogas quimioterápicas, são**

- A) contaminação direta.
- B) formas de estomatotoxicidade indireta.
- C) neurotoxicidade.
- D) mucocele e mucosite.
- E) sialolitíase e sialogogos.

**32. Mãe de paciente portador de Síndrome de Down relata, durante anamnese, presença de prolapso de válvula mitral sem regurgitação, intrínseco à síndrome. Ao exame clínico e radiográfico, verificam-se lesões de cárie profunda, com envolvimento pulpar, nos primeiros molares superiores decíduos. Nesse caso, ao iniciar o tratamento endodôntico do paciente, deve-se proceder à seguinte terapia:**

- A) Profilaxia antibiótica com Amoxicilina 2 g, VO 1 hora antes do procedimento.
- B) Não se deve fazer antibioticoprofilaxia.
- C) Cefalexina 1 g, VO 1 hora antes do procedimento.
- D) Azitromicina 1 g, VO 1 hora antes do procedimento.
- E) Ampicilina 2 g, IM 30 min antes do procedimento.

**33. Ao se analisar radiograficamente um paciente portador de Talassemia, tem-se uma imagem sugestiva de**

- A) raios de sol.
- B) favo de mel.
- C) bolha de sabão.
- D) fios de cabelo em pé.
- E) flocos de algodão.

**34. Com relação ao paciente com tuberculose ativa escarro-positiva, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Pacientes produzindo estavelmente escarro negativo após submeter-se a, pelo menos, 2 e 3 semanas de quimioterapia, deve ser tratado como paciente normal.
- II.** O tratamento odontológico, desde que observados os princípios de biossegurança, não precisa acontecer em hospital.
- III.** Para pacientes com mais de seis anos de idade, o tratamento deve ser limitado a cuidados emergenciais.

**É INCORRETO o que se afirma, apenas, em**

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

**35. Pacientes oncológicos, submetidos a tratamento com quimioterapia e radioterapia, sofrem, na maioria das vezes, com complicações orais devido à imunodepressão adquirida. A mucosite é a mais frequente dessas complicações. Em relação à mucosite, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) A aplicação de triancinolona pomada (OmcilonA em orobase) várias vezes ao dia, associada aos bochechos de enxaguatórios bucais de clorexidina a 0,2% e álcool a 0,3% é indicada no tratamento.
- ( ) São lesões eritematosas semelhantes à queimadura.
- ( ) São lesões ulceradas aleatórias que vão de circunscritas a difusas.
- ( ) Enxágues com solução de bicarbonato de sódio são indicados durante o tratamento.
- ( ) A laserterapia não está indicada, por causar risco ao paciente oncológico.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V-F-F
- B) V-F-V-F-V
- C) F-V-F-V-V
- D) F-V-F-V-F
- E) F-V-V-V-F

**36. Paciente com 72 anos, do sexo masculino, portador de Doença de Parkinson necessita de tratamento odontológico de rotina. Assinale a alternativa que indica o sinal ou o sintoma mais provável a ser observado nesse caso.**

- A) Sialorreia
- B) Taquicinesia
- C) Relaxamento muscular
- D) Xerostomia
- E) Cáries rampantes

**37. Com relação ao paciente com hipertireoidismo, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Em pacientes inadequadamente tratados ou que não receberam tratamento, não se devem utilizar aminopressores.
- II.** Nesses pacientes, é maior o risco de hipertensão, angina e arritmias graves.
- III.** Nesses pacientes, a tempestade tireoideana, como é conhecida a crise tireotóxica, pode ser desencadeada por infecção, trauma, procedimento cirúrgico e estresse.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, II e III.

**38. Com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes (2011), no que se refere ao diagnóstico da situação de saúde desse grupo, é CORRETO afirmar que**

- A) a mortalidade por violência é igual à para o grupo masculino.
- B) relativo ao aparelho cardiovascular, o infarto e o acidente vascular cerebral são destacadamente as principais causas de morte em mulheres.
- C) com relação ao trato respiratório, a embolia é a condição que mais mata mulheres.
- D) o índice de mortalidade materna alcançado no Brasil é compatível com o de países desenvolvidos.
- E) a participação de mulheres no quadro das doenças sexualmente transmissíveis, em particular da AIDS, tem-se mantido baixa.

**39. A aplicação de vacinas, medida já consolidada para a população infantil, ainda é uma prática limitada e recente entre os idosos. As vacinas a serem aplicadas nesse grupo são**

- A) tétano e pneumonia.
- B) tétano e coqueluche.
- C) tétano e difteria.
- D) tétano e tuberculose.
- E) tétano e hepatite.

**40. Com relação aos pacientes portadores de doença da tireoide, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Pacientes com NEM-2 raramente apresentam hipertensão e/ou hipercalcemia.
- II.** Pacientes com NEM-2 podem desenvolver lesões císticas dos maxilares relacionadas ao hiperparatireoidismo.
- III.** No estágio inicial do mixedema, é comum evidenciar-se hipotermia, bradicardia e ataque epiléptico.

**Está CORRETO o que se afirma, apenas, em**

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I.
- E) II.

**41. Dentre os objetivos específicos estabelecidos pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes (2011), está o contido na alternativa**

- A) Promover a melhoria das condições de vida e de saúde da mulher brasileira.
- B) Contribuir para a redução da morbimortalidade feminina no Brasil.
- C) Implantar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sob o enfoque de gênero.
- D) Construir, em parceria com outros atores, um pacto nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal.
- E) Garantir o cumprimento da lei que prevê a reconstrução mamária em mulheres mastectomizadas.



**42. Com relação à Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, é INCORRETO afirmar que**

- A) foi instituída buscando superar a fragmentação, desarticulação e superposição das ações implementadas pelos setores do Trabalho, Previdência Social, Saúde e Meio Ambiente.
- B) considera trabalhador apenas homem ou mulher que exerça atividade para sustento próprio ou de seus dependentes, no setor formal da economia.
- C) a escassez e inconsistência nas informações sobre a real situação de saúde do trabalhador dificulta a definição de prioridades para as políticas públicas, o planejamento e a implementação de ações voltadas a esse grupo.
- D) enquanto gestor nacional do SUS, cabe ao Ministério da Saúde assessorar as secretarias estaduais e municipais de saúde na execução da política.
- E) cabe ao Ministério do Trabalho planejar, coordenar e orientar a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador e da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho.

**43. Com relação ao tratamento imediato no coma mixedematoso, analise as afirmativas abaixo:**

- I. RCP
- II. 100 a 300 mg hidrocortisona
- III. Monitoramento dos sinais vitais
- IV. Ablação por radioiodo

**São procedimentos a serem adotados, apenas, os contidos em**

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I e IV.
- E) III e IV.

**44. Com relação à Política Nacional de Saúde do Idoso, é CORRETO afirmar que**

- A) os dados relativos à internação hospitalar pelo SUS demonstram que os idosos, quando comparados às demais faixas, consomem idênticos recursos de saúde.
- B) somente em nível hospitalar, aos idosos é garantida adequada assistência médica e psicossocial.
- C) a abordagem médica focada na queixa principal mostra-se adequada na abordagem ao idoso hospitalizado, a exemplo do que acontece com o adulto jovem.
- D) uma das razões para as dificuldades na abordagem médica ao paciente idoso é a falta de difusão do conhecimento geriátrico junto aos profissionais de saúde.
- E) o envelhecimento da população é uma questão que não deve extrapolar a esfera familiar e, portanto, a responsabilidade individual dado o alto custo que o envelhecer impõe.

**45. Com relação ao paciente transplantado, analise as afirmativas abaixo:**

- I. No período imediato ao transplante, o tratamento odontológico deve se limitar às necessidades emergenciais.
- II. A consulta ao clínico do paciente com falência de órgão apenas é necessária no tratamento que antecede o transplante dadas as condições de debilidade no qual ele se encontra.
- III. Programa de higiene bucal rígido deve ser instituído, apenas, no período pós-transplante, de forma a se evitar o risco de rejeição.

**Está CORRETO, apenas, o que se afirma em**

- A) III.
- B) II.
- C) I.
- D) I e II.
- E) II e III.

**46. Com relação aos cuidados que o dentista deve ter no atendimento ao paciente transplantado durante o período de estabilização do enxerto, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** O exame deve buscar, dentre outras coisas, evidências clínicas de rejeição do órgão ou imunossupressão acentuada.
- II.** Ainda que na presença de tumores, infecções ou qualquer outra condição sugestiva de imunossupressão, o paciente deve ser atendido em suas necessidades odontológicas.
- III.** Acompanhamento odontológico a esse paciente deve ser agendado a cada 3 meses.

**Está INCORRETO, apenas, o que se afirma em**

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) I e III.

**47. Sangramento excessivo relacionado ao tratamento odontológico de natureza cirúrgica pode ser evidenciado no paciente que recebeu transplante de**

- A) fígado e rim.
- B) coração e rim.
- C) coração e pâncreas.
- D) coração e fígado.
- E) rim e pâncreas.

**48. Trata-se de manifestação bucal frequente nos pacientes com neutropenia:**

- A) doença periodontal.
- B) hiperplasia.
- C) sangramento de mucosa.
- D) necrose de tecido.
- E) úlceras.

**49. Em pacientes com leucemia, ao exame odontológico, pode(m)-se evidenciar**

- A) estomatite aftosa.
- B) edema gengival.
- C) periodontite.
- D) necrose tecidual.
- E) depósitos amiloides nos tecidos moles.

**50. Com relação ao manejo odontológico de pacientes anoréxicos e bulímicos, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Quadros de anorexia podem levar a complicações graves, como ruptura esofágica, arritmia severa e morte.
- II.** Procedimentos restauradores complexos devem ser evitados em pacientes bulímicos até que o vômito tenha sido controlado.
- III.** A realização de restaurações em pacientes bulímicos, que ainda apresentam quadros de vômito, objetiva evitar a sensibilidade térmica nesses pacientes.

**Está CORRETO, apenas, o que se afirma em**

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.





## ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos exigidos para a especialidade.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*