



**01. Ao admitir um paciente na clínica médica, o Enfermeiro realiza a anamnese e o exame físico, etapas que compõem o método clínico. Sobre essas etapas, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Um dos componentes da anamnese é a queixa principal, na qual o Enfermeiro deve registrar, em poucas palavras, o que levou o paciente a procurar o serviço de saúde e, de preferência, repetir as expressões utilizadas por ele para relatar a queixa. Já a história da doença atual (HDA) é a parte principal da anamnese e costuma ser o principal indicativo para o diagnóstico do paciente.
- ( ) Na sistematização do interrogatório sintomatológico, ainda na anamnese, é necessário que o enfermeiro esteja bastante atento. No sistema endócrino, a investigação das manifestações clínicas relacionadas com o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais e as gônadas são imprescindíveis para a definição de um diagnóstico correto.
- ( ) O exame físico é obtido por meio de métodos propedêuticos. Na palpação, utiliza-se o sentido do tato com o objetivo de explorar a superfície corporal, na qual é possível que o enfermeiro verifique e identifique, apenas, a modificação de textura e a consistência da área delimitada.
- ( ) No exame físico do abdome, o Enfermeiro realiza a ausculta antes da percussão e da palpação, uma vez que essas manobras podem alterar os ruídos intestinais. Na ausculta abdominal, além dos ruídos hidroaéreos, podem ser ouvidos sopros sistólicos ou sistodiastólicos ou de fistula arteriovenosa.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V-V                      B) V-V-F-V                      C) F-F-V-F                      D) F-V-V-F                      E) V-V-V-F

**02. Na Consulta de Enfermagem, competência exclusiva do Enfermeiro segundo a Lei n. 7.498/86, em um Hospital Universitário, ao realizar o exame físico o Enfermeiro verifica os Sinais Vitais (SSVV) do paciente. Os SSVV refletem o estado de saúde, a função cardiopulmonar e a função corporal geral.**

**Sobre os SSVV, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A variação normal da frequência cardíaca varia com a idade. Traumatismos, anemia, hemorragia, infecção, medo, febre, dor, hipertiroidismo, choque e ansiedade podem aumentar a frequência do pulso como resultado de demandas metabólicas aumentadas ou volume sanguíneo baixo.
- II.** A hipertermia ocorre na presença de infecções causadas por secreções bacterianas tóxicas, ruptura tecidual provocada por traumatismos, infarto agudo do miocárdio e processos malignos.
- III.** Um dos fatores determinantes da pressão arterial é a volemia, sendo este o fator mais importante na manutenção e regulação da pressão diastólica. O volume de sangue contido no sistema arterial interfere, de maneira direta e significativa, nos níveis das pressões sistólica e diastólica.
- IV.** O ritmo respiratório de Cheyne-Stokes é a condição na qual o paciente se sente mais confortável para respirar em decúbito lateral. Pode ocorrer na insuficiência cardíaca congestiva e no derrame pleural.

**Estão CORRETAS, apenas,**

- A) I e III.                      B) II, III e IV.                      C) II e IV.                      D) I e IV.                      E) I e II.

**03. Sobre sondagem nasogástrica, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Na sondagem nasogástrica, é utilizada a sonda de Levine que está indicada para uso em um período superior a 12 semanas.
- II.** Na instalação da sonda nasogástrica, o enfermeiro dispensa a higienização da lavagem das mãos, uma vez que faz uso de luva estéril.
- III.** A checagem do posicionamento correto da sonda nasogástrica deve ser feita, apenas, pela ausculta, pois é considerado o método de verificação de posicionamento mais confiável.
- IV.** Para verificar a localização correta da sonda nasogástrica, o enfermeiro deve aspirar o conteúdo com uma seringa e determinar o seu pH. O pH do conteúdo gástrico é ácido.

**Está(ão) CORRETA(S), apenas,**

- A) I, II e IV.                      B) III e IV.                      C) II e III.                      D) III.                      E) IV.

**04. Diante da diversidade dos tipos de lesões de pele associadas à assistência hospitalar, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A lesão causada por adesivos é uma lesão por fricção.
- II.** A dermatite associada à incontinência é uma manifestação clínica, causada por lesões de pele, que se originam da umidade comum em pacientes com incontinência fecal e/ou urinária.
- III.** As lesões por pressão são resultantes de pressão isolada ou pressão combinada com fricção e/ou cisalhamento.

**IV.** A lesão por fricção é uma ferida rasa, limitada à derme, associada a um traumatismo mecânico, tendo como principal característica a presença de um retalho de pele em algum momento de sua evolução.

**Estão CORRETAS**

A) I e II, apenas.      B) II e III, apenas.      C) I e III, apenas.      D) I e IV, apenas.      E) I, II, III e IV.

**05. O papel do enfermeiro na administração de medicamentos tem se tornado cada vez mais complexo e diversificado. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:**

**I.** O sítio ventroglúteo é considerado o mais seguro e o menos doloroso para a administração de injeção por via intramuscular.  
**II.** Os medicamentos preparados em uma base de óleo e substâncias insolúveis não podem ser administrados pela via intravenosa.  
**III.** A insulina não precisa ser refrigerada para o uso de curto prazo. Um frasco de 10 mL de insulina manterá sua potência por 1 mês sem refrigeração.

**Está(ão) CORRETA(S)**

A) I e II, apenas.      B) II e III, apenas.      C) I, II e III.      D) I, apenas.      E) II, apenas.

**06. O paciente chega ao serviço de saúde, onde é prescrito Dilacorón 3 mg Endovenoso (EV). No serviço encontra-se disponível o medicamento em ampolas de 5mg/2mL. A administração desse medicamento por via EV deve ser lenta. Quantos mL da medicação devem ser administrados?**

A) 1,2 mL      B) 3,0 mL      C) 2,5 mL      D) 2,0 mL      E) 1,5 mL

**07. O cateterismo vesical envolve a introdução de uma sonda através da uretra até o interior da bexiga. Sobre cateterismo vesical, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) O tamanho do cateter é determinado pela finalidade do procedimento; geralmente em homens, são instaladas sondas de 14 a 16 Fr.  
 B) Os cateteres plásticos são recomendados para uso em até 3 semanas; é importante se ter atenção em relação às alergias.  
 C) O tamanho do balão é importante na escolha de um cateter intermitente. O tamanho dos balões varia de 3 mL em crianças e, em adultos, de 5 a 30 mL.  
 D) usa-se sempre solução salina para inflar o balão por se tratar de substância mais segura.  
 E) Os cateteres de silicone puro ou teflon são menos adequados para uso por longa duração, devido à maior incrustação no meato uretral.

**08. Sobre Diabetes tipo 2 (DM2), analise as afirmativas abaixo:**

**I.** Um dos critérios diagnósticos para o diabetes é a glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL. O período de jejum deve ser definido como ausência de ingestão calórica pelo menos 8 horas. Na ausência de hiperglicemia comprovada, os resultados devem ser confirmados com a repetição dos testes.  
**II.** A prática da automonitorização glicêmica no DM2 desempenha um papel de grande importância no conjunto de ações dirigidas ao bom controle do diabetes. Nas avaliações clínicas, verifica-se a existência de um grande número de pessoas com DM2 que apresentam um significativo descontrole do perfil glicêmico, situação essa que decorre da não utilização da automonitorização glicêmica.  
**III.** A insulino terapia no DM2 deve ser intensificada de forma progressiva e adequada, para facilitar a adesão e evitar reações hipoglicêmicas, que podem ser uma barreira para alcançar o bom controle metabólico. A insulino terapia pode ser necessária a qualquer tempo, durante a evolução natural do DM2, sempre que se constatar um descontrole glicêmico acentuado com o tratamento em vigor.  
**IV.** Para o sucesso no tratamento do diabetes, é necessário que seja implementado concomitantemente três modalidades de intervenções: estratégias educacionais, de automonitorização e farmacológicas.

**Estão CORRETAS**

A) I e IV, apenas.      B) II e III, apenas.      C) I, II, III e IV.      D) III e IV, apenas.      E) I e III, apenas.

**09. Sobre os distúrbios gastrintestinais, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

( ) Na gastrite, a mucosa se torna edemaciada e hiperemiada e sofre com a erosão superficial, secretando uma grande quantidade de suco gástrico que contém muito ácido e pouco muco.  
 ( ) A gastrite crônica está associada, exclusivamente, a fatores dietéticos.

- ( ) A esofagite, além de ser causada pelo refluxo gastroesofágico, pode resultar de causas infecciosas, químicas e ser induzida por medicação.
- ( ) A diverticulite pode ser leve e aguda grave. Nos processos agudos graves, o paciente pode apresentar dor em cólica no quadrante inferior esquerdo do abdome, febre baixa, calafrio, leucocitose, e a sepse pode se disseminar através da veia porta para o fígado, causando abscessos hepáticos.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) F-F-V-V                      B) V-V-F-V                      C) F-V-F-V                      D) F-F-F-F                      E) V-V-V-V

10. Sobre os distúrbios da glândula tireoide, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O hipotireoidismo primário é causado por tireoidite de Hashimoto, uso de iodo radioativo, terapia com lítio e deficiência dietética de iodo.
- II.** São sinais e sintomas do hipotireoidismo: fadiga, letargia, ganho de peso, queixa de mãos e pés frios, redução na capacidade de concentração e hiperlipoproteinemia e hipercolesterolemia.
- III.** O hipertireoidismo é mais comum em homens que em mulheres, sendo observado em apenas 2% da população feminina.
- IV.** São complicações do hipertireoidismo: toxicidade das tioamidas, hipotireoidismo, tireoidite por radiação e oftalmopatia infiltrativa.

Estão CORRETAS

- A) I e III, apenas.                      B) I, II e IV, apenas.                      C) II e III, apenas.                      D) III e IV, apenas.                      E) I, II, III e IV.

11. A pielonefrite bacteriana aguda é uma infecção e doença inflamatória aguda dos rins e da pelve renal. Sobre pielonefrite bacteriana, analise as afirmativas abaixo:

- I.** As bactérias entéricas, como *E.coli*, constituem os patógenos mais comuns; outros patógenos Gram-negativos incluem espécies, como *Proteus*, *Klebsiella* e *Pseudomonas*. As bactérias Gram-positivas são menos comuns e incluem *Enterococcus* e *Staphylococcus aureus*.
- II.** Febre, calafrios, dor no flanco, náuseas, vômitos, anorexia e hipersensibilidade do ângulo costovertebral são manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes. O exame de urina é realizado para identificar a presença de leucócitos, bactérias e hemácias na urina e ainda observar a presença de cilindros leucocitários.
- III.** São Diagnósticos de Enfermagem: Hipertermia devido à infecção e Dor Aguda devido ao edema renal. Administrar antibióticos, de acordo com a prescrição, e monitorizar o aparecimento dos efeitos adversos e administrar analgésico são intervenções de enfermagem propostas para o paciente.
- IV.** Para pacientes com infecções graves, está indicado antibioticoterapia oral, e o tratamento deve ser realizado ambulatorialmente. Após o término da antibioticoterapia, não há necessidade de repetir as culturas de urina.

Estão CORRETAS, apenas,

- A) II e III.                      B) I e III.                      C) III e IV.                      D) I, II e III.                      E) I e IV.

12. Sobre os distúrbios hematológicos, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O exame físico pode revelar achados anormais em diversos sistemas orgânicos, causados por anemia, sangramento ou coagulação descontrolados ou alteração da função imunológica, levando à infecção em pacientes com distúrbios hematológicos.
- II.** Um paciente com Leucemia Aguda apresenta o seguinte Diagnóstico de Enfermagem: risco de lesão devido ao sangramento secundário à trombocitopenia, coagulação intravascular disseminada ou leucostase associada à leucemia. Para esse Diagnóstico, é proposto como Intervenção de Enfermagem restringir a atividade com base na avaliação da contagem plaquetária e na presença de sangramento ativo.
- III.** Terapia transfusional para repor as plaquetas e os eritrócitos, antibioticoterapia, agentes antivirais e antifúngicos e imunoglobulinas fazem parte do tratamento de apoio para os portadores de Leucemia Linfocítica Crônica (LLC).
- IV.** A leucemia mieloide crônica (LMC) é caracterizada por uma anormalidade genética adquirida, denominada de cromossomo Philadelphia (Ph), a primeira doença neoplásica, que se caracterizou uma alteração cromossômica.

Estão CORRETAS

- A) I e II, apenas.                      D) II, III e IV, apenas.  
 B) II e III, apenas.                      E) I, II, III e IV.  
 C) I e IV, apenas.





**21. Ainda sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), para garantir o cuidado seguro ao paciente; a higienização das mãos não deve ocorrer antes de se manusear um dispositivo invasivo, se o enfermeiro estiver usando uma luva estéril.
- ( ) Está indicado lavar as mãos com sabonete líquido e água: quando estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais, após uso do banheiro; quando a exposição a potenciais patógenos formadores de esporos for fortemente suspeita ou comprovada, inclusive surtos de *C.difficile.*; em todas as outras situações, nas quais houver impossibilidade de obter preparação alcoólica.
- ( ) A avaliação do risco para desenvolvimento de úlcera por pressão (UPP) deverá ser executada através da Escala de Braden para pacientes com mais de 5 anos. A escala de Braden caracteriza o paciente sem risco, com risco baixo, moderado, alto ou muito alto para desenvolver UPP. A classificação do risco dá-se de maneira proporcional à pontuação, ou seja, quanto maior o número de pontos, maior é a classificação de risco para a ocorrência dessa lesão.
- ( ) No procedimento operacional da inspeção da pele, está recomendado: examinar a pele do paciente cuidadosamente para identificar a existência de UPP. No exame físico de admissão ou de readmissão, examine a pele do paciente cuidadosamente para identificar alterações da integridade cutânea e úlceras por pressão existentes. Para uma apropriada inspeção da pele, deve-se ter especial atenção às áreas corporais de maior risco para UPP, como as regiões anatômicas sacral, calcâneo, ísquio, trocanter, occipital, escapular, maleolar e regiões corporais submetidas à pressão por dispositivos como a presença de cateteres, tubos e drenos.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V-V-F-F                      B) V-F-F-F                      C) F-V-V-V                      D) F-V-F-V                      E) V-V-F-V

**22. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Sobre a PNH, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Incluir os trabalhadores na gestão é fundamental para que eles, no dia a dia, reinventem seus processos de trabalho e sejam agentes ativos das mudanças no serviço de saúde. Incluir usuários e suas redes sociofamiliares nos processos de cuidado é um poderoso recurso para a ampliação da corresponsabilização no cuidado de si.
- ( ) A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido.
- ( ) As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.
- ( ) Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/ populações. Com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário, é possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de saúde.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) F-F-V-V                      B) V-V-F-V                      C) V-V-V-V                      D) F-F-V-F                      E) F-V-V-F

**23. Sobre cirurgia cardíaca, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** O tamponamento cardíaco é resultante de sangramento dentro da bolsa pericárdica ou do acúmulo de líquidos dentro da bolsa pericárdica. É sinal de tamponamento o baixo débito cardíaco no pós-operatório.
- II.** A hiperpotassemia pode ser causada pela ingesta inadequada, por diuréticos, vômitos, drenagem da sonda nasogástrica excessiva e estresse cirúrgico.
- III.** A hipercalcemia pode ser uma das causas de arritmias semelhantes às causadas por intoxicação digitálica.
- IV.** São Diagnósticos de Enfermagem apresentados pelos pacientes em pós-operatório: Comprometimento das Trocas Gasosas relacionado com alterações na membrana alveolocapilar, imobilidade e alteração do fluxo sanguíneo e Diminuição do Débito Cardíaco relacionado com os fatores mecânicos: diminuição da pré-carga e comprometimento da contratilidade.

**Estão CORRETAS, apenas,**

- A) I e III.                      B) II, III e IV.                      C) I, III e IV.                      D) II e IV.                      E) II e III.

**24. A drenagem torácica é um procedimento cirúrgico. Ela é frequentemente utilizada no tratamento hospitalar de pacientes com trauma de tórax e/ou submetidos a cirurgias torácicas ou cardíacas. Sobre esse procedimento, analise as afirmativas abaixo:**

- I. A drenagem torácica é uma técnica, que tem por objetivo principal a remoção de conteúdo líquido, gasoso, purulento ou sanguinolento do interior da cavidade pleural ou do mediastino.
- II. A técnica de drenagem torácica pode ser realizada de modo fechado ou aberto.
- III. A posição do paciente deve ser decúbito dorsal levemente elevado com o braço levantado.
- IV. Manter sempre o frasco de drenagem em nível superior ao tórax do paciente.

**Está(ão) CORRETA(S)**

- A) IV, apenas.                      B) I, II e III, apenas.                      C) III e IV, apenas.                      D) II e IV, apenas.                      E) I, II, III e IV.

**25. Define-se transporte intra-hospitalar como a transferência temporária ou definitiva de pacientes por profissionais de saúde dentro do ambiente hospitalar. O sucesso no transporte intra-hospitalar depende diretamente do planejamento e da atuação organizada da equipe multiprofissional, bem como da escolha de equipamentos adequados. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:**

- I. Antes de transportar o paciente, deve haver uma comunicação eficaz entre o local de origem e o de espera; avaliação do paciente e sua condição atual.
- II. As complicações no transporte do paciente estão relacionadas às alterações fisiológicas do paciente, problemas na equipe multidisciplinar envolvida no transporte/comunicação interequipe e falha nos equipamentos.
- III. A presença da equipe de enfermagem é fundamental durante o transporte, pois diminui a incidência de eventos adversos, tipo a falta de conhecimento do profissional e a falha de comunicação.
- IV. A falha dos equipamentos está relacionada com equipamentos de ventilação, equipamentos de infusão, equipamentos de monitoração e acesso intravenoso.

**Estão CORRETOS**

- A) I e II, apenas.                      B) I e III, apenas.                      C) II e III, apenas.                      D) I, II, III e IV.                      E) I e IV, apenas.

**26. Sobre os eventos agressivos presentes no ambiente cirúrgico, passíveis de atingir o paciente, analise os itens abaixo:**

- I. Lesões de pele frente aos agentes químicos
- II. Queimaduras elétricas
- III. Produtos removedores de gordura
- IV. Agentes adesivos

**Estão CORRETAS**

- A) I e II, apenas.                      B) I e III, apenas.                      C) II e IV, apenas.                      D) III e IV, apenas.                      E) I, II, III e IV.

**27. Estoma, ostoma, estomia ou ostomia são palavras de origem grega, que significam boca ou abertura, exteriorização de qualquer víscera oca através do corpo. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo:**

- I. As ostomias intestinais, dependendo do segmento exteriorizado, podem ser jejunostomias, ileostomias e colostomias.
- II. Estão indicadas para o tratamento de várias doenças que incluem o câncer colorretal, doença diverticular, doença inflamatória intestinal, entre outras.
- III. Os estomas permanentes substituem a perda de função esfinteriana, resultante do tratamento cirúrgico ou incontinência, quando não há sucesso com outras opções, com o intuito de restaurar a evacuação por via anal.
- IV. Em cada uma das fases do planejamento cirúrgico, o estomaterapeuta possui objetivos claros, e a fase pré-operatória é essencial para a prevenção de complicações e promoção da reabilitação.

**Estão CORRETAS**

- A) I e II, apenas.                      B) II e III, apenas.                      C) III e IV, apenas.                      D) II e IV, apenas.                      E) I, II, III e IV.

**28. Cuidado paliativo é uma abordagem, que promove a qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:**

- I. O cuidado paliativo é baseado em princípios e não, em protocolos.
- II. A indicação do cuidado paliativo está relacionada a todos os pacientes portadores de doença grave, progressiva e incurável, que ameacem a continuidade da vida.

- III.** A avaliação do prognóstico busca reforços constantes em escalas sinais e sintomas, que podem identificar o processo de morte em fases precoces.
- IV.** A avaliação funcional em cuidado paliativo é secundária para a vigilância da curva evolutiva da doença e não apresenta significância para a tomada de decisão em relação ao prognóstico.

Estão **CORRETAS**, apenas,

- A) II e III.                      B) I, II e III.                      C) II e IV.                      D) I e IV.                      E) II, III e IV.

**29. O paciente em cuidado paliativo apresenta frequentemente condições, que impossibilitam a administração de medicamentos. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A hipoderme é composta de densas conexões e tecido adiposo. A vascularização do tecido subcutâneo abriga cerca de 6% do débito cardíaco e permite uma taxa de absorção muito similar à da administração intramuscular.
- II.** As principais medicações da hipodermólise são: prevenção ou tratamento da desidratação moderada e impossibilidade de acesso venoso.
- III.** Não existe contraindicação para a utilização de hipodermólise, e são inúmeras as suas vantagens.

Está(ão) **CORRETA(S)**

- A) I e II, apenas.                      B) I e III, apenas.                      C) II e III, apenas.                      D) I, II e III.                      E) II, apenas.

**30. Considerando os conhecimentos atuais relacionados ao seguimento da sífilis adquirida e da sífilis na gestação, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A redução de dois ou mais títulos do teste não treponêmico ou a negatificação após seis meses a nove meses do tratamento demonstra a cura da infecção.
- II.** Pessoas que tiveram o diagnóstico de sífilis confirmado após o secundarismo podem permanecer com resultados reagentes em testes treponêmicos pelo resto da vida.
- III.** A elevação de títulos dos testes não treponêmicos em duas diluições em relação ao último exame realizado indica reinfecção, e um novo tratamento deve ser iniciado.
- IV.** O receio de ocorrência de reações adversas é impeditivo para a administração de penicilina benzatina na Atenção Básica.

Estão **CORRETAS**, apenas,

- A) I, II e III.                      B) II e III.                      C) I e III.                      D) II e IV.                      E) I, II e IV.

**31. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde do Brasil para o rastreamento, prevenção e detecção precoce do câncer de mama, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) O Ministério da Saúde recomenda que a periodicidade do rastreamento com mamografia na faixa etária de 60 a 79 anos seja anual.
- B) O Ministério da Saúde recomenda o ensino do Autoexame das Mamas como método de rastreamento do câncer de mama.
- C) O objetivo do rastreamento é identificar pessoas com sinais e sintomas iniciais de uma determinada doença.
- D) O rastreamento é uma estratégia baseada na realização de testes relativamente simples em pessoas saudáveis, com o intuito de identificar doenças em sua fase pré-clínica.
- E) O Ministério da Saúde recomenda que toda a avaliação diagnóstica do câncer de mama, após a identificação de sinais e sintomas suspeitos, seja realizada em centros de referência diversificados da atenção primária.

**32. Assinale a alternativa CORRETA em relação às definições ou orientações estabelecidas nas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde.**

- A) A conduta fisiológica no terceiro estágio do parto envolve um conjunto de cuidados que inclui o uso rotineiro de uterotônicos.
- B) A conduta ativa é recomendada na assistência ao terceiro estágio do parto porque está associada com menor risco de hemorragia e transfusão sanguínea, mas, se uma mulher com baixo risco de hemorragia pós-parto, solicitar conduta expectante, deve-se apoiá-la em sua escolha.
- C) O terceiro estágio do parto é considerado prolongado quando, após uma hora, ainda não ocorreu a expulsão da placenta.
- D) Na assistência ao recém-nascido, de acordo com a diretriz, deve-se realizar o clampeamento do cordão umbilical entre 1 a 3 minutos, exceto se houver alguma contraindicação em relação ao cordão ou necessidade de reanimação neonatal.
- E) A conduta ativa no terceiro estágio do parto envolve a recomendação de clampeamento do cordão umbilical no quinto minuto do nascimento.

**33. As recomendações atuais da Organização Mundial de Saúde para a prevenção da Hemorragia Pós-Parto envolvem algumas recomendações. Sobre estas, analise os itens abaixo:**

- I.** Conduta fisiológica do terceiro estágio – não realização de tração de cordão umbilical.  
**II.** Uso de ocitocina 10 unidades diluídas em soro glicosado – solução endovenosa após partos normais.  
**III.** Gentil massagem uterina a cada 15 minutos após dequitação nas primeiras 2 horas de pós-parto.  
**IV.** Contato pele a pele (mãe e RN).

Estão **CORRETAS**, apenas,

- A) III e IV.                      B) I e III.                      C) I, II e III.                      D) I e IV.                      E) II e IV.

**34. O dimensionamento de Pessoal é a etapa inicial do provimento de pessoal, que tem por finalidade a previsão da quantidade de funcionários por categoria, requerida para suprir as necessidades de assistência de enfermagem, direta ou indiretamente prestada à clientela. Para o cálculo da quantidade de profissionais de enfermagem para uma unidade de internação de acordo com a Resolução COFEN 293/2004, é utilizada a fórmula:  $QP = Km \times THE$ , onde QP é a quantidade de profissionais de enfermagem, THE é o total de horas de enfermagem e Km a Constante Marinho. A Constante Marinho é um coeficiente baseado nos dias**

- A) do mês, na jornada mensal de trabalho e na taxa de ocupação.  
 B) da semana, na jornada mensal de trabalho e na taxa de ocupação.  
 C) do mês, na jornada diária de trabalho e no índice de segurança técnica.  
 D) da semana, na jornada semanal de trabalho e no índice de segurança técnica.  
 E) do mês, na jornada mensal de trabalho e no índice de segurança técnica.

**35. As práticas profissionais podem ser explicadas, segundo diferentes enfoques. A ênfase em uma ou mais variáveis permeia os marcos conceituais dessas teorias, dando-lhes caráter específico. No que se refere às Teorias da Administração aplicadas na organização dos serviços de saúde e de enfermagem, associe a Teoria aos seus pressupostos.**

**Teoria de Administração**

**Pressuposto**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Teoria Científica ou Taylorismo | A. Nessa abordagem, a preocupação com a “estrutura” transferiu-se para o “processo” e para a “dinâmica organizacional”. A ênfase, entretanto, se mantém na variável pessoas.  |
| 2. Teoria Clássica                 | B. Preocupa-se exclusivamente com a estrutura formal da organização. Nas instituições de saúde, essa Teoria é representada pela estrutura rigidamente hierarquizada, com estabelecimento de subordinação de um indivíduo a outro e de um serviço a outro. |
| 3. Teoria das Relações Humanas     | C. O ponto mais crítico dessa teoria é seu aspecto mecanicista, considerando o homem como peça de uma engrenagem. Predominam regras e diretrizes que padronizam e determinam o comportamento do trabalhador na organização.                               |
| 4. Teoria Comportamentalista       | D. Os conceitos clássicos de autoridade, hierarquia e racionalização do trabalho, entre outros, passaram a ser contestados. Na enfermagem, essa Teoria contribui com a proposição da liderança como estratégia de condução do grupo.                      |
| 5. Teoria Burocrática              | E. Valorização das normas e regulamentos. Visa à eficiência organizacional como objetivo básico. As emoções não fazem parte do comportamento estabelecido.  |

**Assinale a alternativa que corresponde à associação CORRETA.**

- A) 1B – 2C – 3E – 4A – 5 D  
 B) 1C – 2B – 3D – 4A – 5 E  
 C) 1A – 2E – 3C – 4D – 5 B  
 D) 1C – 2D – 3A – 4B – 5 E  
 E) 1A – 2C – 3D – 4E – 5 B

**36. Leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) A fim de propiciar autonomia e resolutividade administrativa, a Lei N° 8080/90 define que a transferência de recursos financeiros para as ações não precisa estar prevista no plano de saúde nem da fiscalização do Conselho de Saúde.

- ( ) A Lei Nº 8142/90 define, ao mesmo tempo, a participação da comunidade e as transferências de recursos para o financiamento do SUS.
- ( ) A ordenação da formação de pessoas para o trabalho no SUS é feita pela Constituição Federal e reforçada pela Lei Orgânica da Saúde, que preconiza a criação das comissões intersetoriais para tratar da atividade de recursos humanos e, especificamente, pela Portaria Nº 1.996, de 20 de agosto de 2007.
- ( ) De acordo com a Constituição Federal de 1988 e a Lei Nº 8080/90, a formulação da política e da execução das ações de saneamento básico é da responsabilidade do SUS e uma das medidas de proteção contra doenças, como as arboviroses.
- ( ) De acordo com a Constituição Federal de 1988, o desenvolvimento do SUS exige incremento do desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de atuação.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) F-F-F-V-V      B) F-V-V-F-V      C) F-V-V-F-F      D) V-V-V-V-F      E) F-V-V-V-F

**37. Sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) A correta e necessária organização assistencial em níveis de complexidade exige que a atenção básica seja a única porta de entrada no SUS.
- ( ) A primazia dos serviços de atenção básica na ordenação do acesso universal e igualitário é fundamental para a correta e necessária organização hierárquica dos serviços de saúde.
- ( ) Dada a importância da atenção básica na organização hierárquica do SUS, só os serviços desse nível de atenção podem e devem referenciar os serviços hospitalares e ambulatoriais especializados.
- ( ) De acordo com o Decreto 7508/11, a organização do SUS é regionalizada, por isso mesmo deve ser municipalizada.
- ( ) De acordo com o Decreto 7508/11, os ambulatórios especializados e os hospitais integram a região de saúde, embora sejam componentes do SUS.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) F-V-V-F-F      B) F-V-F-V-F      C) F-V-F-F-F      D) V-F-F-F-V      E) F-F-V-V-V

**38. Ainda sobre a organização do SUS, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) De acordo com as normativas do SUS, uma Rede de Atenção à Saúde é uma maneira de organizar ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, devem garantir a integralidade do cuidado.
- ( ) De acordo com as normativas do SUS, a integralidade da atenção não exige a organização de Rede de Atenção à Saúde e de Regiões de Saúde.
- ( ) De acordo com as normativas do SUS, devido às características tecnológicas, os serviços da atenção primária à saúde não podem integrar a rede de atenção à urgência.
- ( ) De acordo com as normativas do SUS, os procedimentos de acolhimento e de classificação de risco devem estar presentes, principalmente nos serviços que se constituem em portas de entradas da Rede de Atenção nas Regiões de Saúde.
- ( ) De acordo com as normativas do SUS, os hospitais integrantes do SUS formam um ponto ou conjunto de pontos de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser definidos, conforme o perfil demográfico e epidemiológico da população e de acordo com o desenho da RAS loco-regional, vinculados a uma população de referência com base territorial definida, com acesso regulado e atendimento por demanda referenciada e/ou espontânea.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V-F-F-V-V      D) F-F-V-V-F  
 B) V-F-V-F-V      E) F-V-V-V-V  
 C) F-F-V-V-V

**39. Na prestação do cuidar humanizado, é fundamental que a equipe de enfermagem conheça as grandes Síndromes Psiquiátricas ao longo da vida.**

**Acerca dos transtornos psiquiátricos, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** O transtorno de ajustamento é descrito como uma resposta de acentuado sofrimento a um estressor que excede o que seria esperado, gerando, na maioria dos casos, algum grau de prejuízo no funcionamento de alguma área da vida social e profissional.
- II.** Os subgrupos dos Transtornos do Controle dos Impulsos são: jogo patológico, hipocondria, tricolomania e piromania.

**III.** O paciente com Transtorno de Personalidade Histriônico apresenta dramaticidade, expressão de afeto intenso e necessidade de atenção.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, II e III.                      B) I e III, apenas.                      C) I, apenas.                      D) II, apenas.                      E) III, apenas.

**40. Quanto às características de comportamento dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, é CORRETO afirmar que apresentam**

- A) desatenção, hiperatividade e impulsividade que podem se manifestar de forma isolada ou coexistir.  
 B) padrão persistente de agressividade e comportamento antissocial por meio dos quais um indivíduo repetidamente rompe regras sociais.  
 C) prejuízos qualitativos na capacidade de interação social, dificuldade qualitativa de comunicação verbal e não verbal e interesses restritos ou comportamentos repetitivos.  
 D) distúrbio progressivo da memória e de outras funções cognitivas, afetando o funcionamento ocupacional e social.  
 E) funcionamento intelectual global significativamente inferior da média.

**41. O crescente número de idosos na população e a diminuição da fertilidade levaram o Brasil a um cenário de transformação demográfica e epidemiológica. Com as peculiaridades dos idosos, como a plurimorbidade e as incapacidades com restrição da sua autonomia, emerge a necessidade de um novo olhar ético, do qual a ética do cuidado parece ser uma perspectiva de abordagem adequada à pessoa idosa (MENEZES, 2016).**

**Diante dos aspectos éticos e bioéticos voltados para a pessoa idosa, analise as assertivas abaixo:**

- I.** Os idosos são considerados como vulneráveis, ou seja, se encontram em risco elevado de declínio funcional e morte. Nesse contexto, estão mais susceptíveis às plurimorbidades ou manifestações atípicas de doenças comuns.  
**II.** A ética do cuidado do paciente ou de indivíduos mais vulneráveis, como é o caso dos idosos, não transcende os profissionais da área de saúde.  
**III.** Apesar de ser óbvia, a ética do cuidado não é prática comum. Isso se deve ao fato de que o campo de cuidado está, ainda, muito voltado a prover curas.  
**IV.** Uma ética do cuidado voltada a pessoas que necessitam de atenção permanente é de grande relevância e atinge, principalmente, questões associadas à geriatria e à gerontologia.

**Estão CORRETAS**

- A) I, II, III e IV.                      B) I, II e III, apenas.                      C) I, III e IV, apenas.                      D) II, III e IV, apenas.                      E) III e IV, apenas.

**42. A denominação síndrome geriátrica é utilizada para definir um conjunto de sinais e sintomas decorrentes de enfermidades de grande prevalência na população idosa. Sobre as síndromes geriátricas, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) As síndromes geriátricas têm como característica comum a institucionalização dos idosos.  
 B) Uma síndrome geriátrica pode ser a causa de outra síndrome, gerando maior morbidade e consequências mais graves.  
 C) A incapacidade cognitiva está relacionada com o comprometimento de funções encefálicas inferiores, prejudicando a integração da pessoa com seu meio e sua funcionalidade.  
 D) Nas síndromes geriátricas, a depressão é também conhecida como síndrome confusional aguda.  
 E) Na síndrome da instabilidade postural, a queda é descrita como um deslocamento intencional do corpo, com incapacidade de correção em tempo hábil.

**43. O cuidado no contexto da enfermagem gerontogeriatrica refere-se ao cuidado de Enfermagem, permeado por conhecimentos teórico e prático da enfermagem, da gerontologia e da geriatria, com o propósito de utilizá-los para a elucidação do processo de assistência, buscando melhor atender à promoção de saúde e à longevidade, à garantia da independência ao nível mais alto possível de vivacidade da pessoa idosa.**

**Com relação ao processo de enfermagem à pessoa idosa, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Na aplicação prática do processo de enfermagem no planejamento do cuidado às pessoas idosas, deve-se levar em consideração toda a interação intuitiva do profissional enfermeiro.  
**II.** A evolução das teorias de enfermagem refere que, tanto a arte ou ciência, a enfermagem pauta-se na profunda relação entre o enfermeiro e o cliente, numa perspectiva humanística que vislumbra como resultado esperado um cuidado efetivo e terapêutico.  
**III.** A uniformização do uso de sistemas de classificação garante qualidade assistencial diante do programa de assistência de enfermagem à pessoa idosa. Trata-se de uma ferramenta, que favorece a execução do cuidado perante as fases do processo, através dos fenômenos de enfermagem descrito, dos resultados esperados e do cuidado continuado e efetivo, contido no plano assistencial.

**IV.** Um grande desafio à enfermagem, em face da necessidade de planejamento dos cuidados de enfermagem com base em um referencial teórico, é identificar um modelo contextual, que coadune com a sua prática e a clientela a ser assistida. No processo de envelhecimento, é necessário ter foco no processo de mudança inerente à senectude.

Estão **CORRETAS**

A) I, II, III e IV.      B) I, II e III, apenas.      C) I, III e IV, apenas.      D) II, III e IV, apenas.      E) III e IV, apenas.

**44. De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis, a notificação é obrigatória no caso de sífilis adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, conforme a Portaria vigente, MS 2015.**

**Em relação à sífilis congênita, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- A sífilis congênita é de notificação compulsória nacional desde o ano de 1986.  
 A sífilis congênita é de notificação compulsória nacional desde o ano de 1980.  
 A sífilis congênita é de notificação compulsória nacional desde o ano de 2005.  
 A sífilis em gestante é de notificação compulsória nacional desde o ano de 2005.  
 A sífilis em gestante é de notificação compulsória nacional desde o ano de 2010.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

A) V-F-F-V-F      B) V-V-F-V-F      C) V-F-F-F-V      D) F-V-F-V-F      E) V-F-F-F-V

**45. A Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA) em criança tem como causa mais frequente a infecção pelo Streptococcus β-hemolítico do Grupo A de Lancefield. Em relação à ocorrência em Pediatria, é CORRETO afirmar que**

- A) as manifestações renais ocorrem, geralmente, de dois a 3 dias após a infecção de pele ou das vias aéreas.  
 B) a apresentação típica da GNDA inclui hipertensão, hematúria, edema de membros inferiores e periorbital.  
 C) GNDA pós-infecciosa pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum nos maiores de 15 anos.  
 D) é uma doença aguda de base imunológica, caracterizada pelo processo não inflamatório, que acomete todos os glomérulos de ambos os rins.  
 E) pode ocorrer de forma esporádica ou durante epidemia pelos estafilococos beta-hemolítico do grupo "A".

**46. Com relação à Vacina Tríplice Viral, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- Na rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a vacinação infantil, a primeira dose dessa vacina é aplicada aos 12 meses de idade.  
 Para ser considerado protegido, todo indivíduo deve ter tomado duas doses na vida, com intervalo mínimo de um mês, independentemente da idade.  
 Para crianças, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm) recomendam como rotina duas doses: uma aos 12 meses, e a segunda, quando a criança estiver entre 1 ano e 3 meses e 2 anos de idade, junto com a vacina varicela.  
 Crianças mais velhas, adolescentes e adultos não vacinados: duas doses com intervalo de um a dois meses.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

A) V-V-V-F      B) V-F-V-V      C) V-V-V-V      D) F-V-V-V      E) V-V-F-F

**47. A nutrição adequada nos primeiros anos de vida irá repercutir em toda a vida e saúde do indivíduo. A criança pequena, devido a sua acentuada velocidade de crescimento, representa um dos grupos mais vulneráveis a erros e deficiências da alimentação, sobretudo durante o período do desmame e na vigência de processos infecciosos. De acordo com os 10 passos do guia do Ministério da Saúde em relação à alimentação complementar após os 6 meses, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- Os alimentos devem ser amassados bem com o garfo, e a consistência deverá ter o aspecto pastoso (papa/purê). Não há necessidade de passar pela peneira nem bater no liquidificador.  
 Sopas e comidas ralas/moles não fornecem energia suficiente para a criança. A alimentação oferecida ao bebê, depois dos seis meses, deve ser composta de grãos (cereais e feijões), carnes, frutas e verduras.  
 A partir dos 8 meses, podem ser oferecidos os mesmos alimentos preparados para a família, desde que amassados, desfiados, picados ou cortados em pedaços pequenos.  
 Faça a introdução de alimentos novos de maneira gradual, oferecendo apenas um alimento novo a cada refeição.

( ) Quando a criança recusa determinado alimento, não se deve oferecer novamente em outras refeições. Respeitar a aceitação da criança.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V-V                      B) V-V-F-F                      C) F-V-V-V                      D) V-V-V-F                      E) F-V-V-F

**48. A tuberculose provavelmente chegou ao Brasil pelos europeus, no século XVII. Relatos dos primeiros visitantes da colônia mostram que os agrupamentos indígenas gozavam de perfeita saúde e que, após contato com os colonizadores, passaram a desenvolver e a morrer de uma grave doença pulmonar acompanhada de hemoptises. É considerada uma doença socialmente determinada, pois sua ocorrência está diretamente associada à forma como se organizam os processos de produção e de reprodução social, assim como a implementação de políticas de controle da doença.**

Sobre essa doença, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A localização da tuberculose (TB) em outros órgãos que não o pulmão geralmente decorre de disseminações linfo-hematogênicas, embora outros mecanismos também possam ser responsabilizados, como a via canicular, a extensão direta ou a inoculação direta.
- II.** A vacina BCG é uma vacina atenuada, e cada dose administrada contém cerca de 200 mil ou até mais de um milhão de bacilos. A administração da vacina é intradérmica, no braço direito, na altura da inserção do músculo deltoide. Essa localização permite a fácil verificação da existência de cicatriz para efeito de avaliação do programa e limita as reações ganglionares na região axilar.
- III.** A Tuberculose (TB) é uma doença altamente transmissível. O risco de transmissibilidade em instituições de saúde é reconhecido há muitas décadas. O risco de transmissão da doença a partir de uma determinada fonte está associado à carga bacilar, presente em gotículas eliminadas pela tosse, pelo espirro ou pela fala e à duração da exposição e a fatores ambientais que determinam a remoção dos núcleos secos das gotículas em suspensão no ar.
- IV.** A susceptibilidade à infecção é praticamente universal. A maioria das pessoas não resiste ao adoecimento após a infecção e desenvolve imunidade parcial à doença; no entanto, alguns bacilos permanecem vivos, embora bloqueados pela reação inflamatória do organismo. Cerca de 5% das pessoas não conseguem impedir a multiplicação dos bacilos e adoecem na sequência da primo-infecção.
- V.** A atividade de controle de contatos não é uma ferramenta importante para prevenir o adoecimento e diagnosticar precocemente casos de doença ativa em uma população e deve ser instituída pelos programas de controle de Tuberculose. Apesar de os contatos de pacientes com TB bacilíferos terem maior risco de adoecimento, todos os contatos devem ser avaliados.

Estão CORRETAS

- A) I, III e IV, apenas.  
 B) I, II e III, apenas.  
 C) II e V, apenas.  
 D) I, III e V, apenas.  
 E) I, II, III, IV e V.

**49. Arboviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. A classificação "arbovírus" engloba todos aqueles transmitidos por artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos. Atualmente, o Brasil tem vivenciado uma epidemia de arboviroses. Com relação à Definição de Caso Suspeito dessas doenças, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Dengue: paciente apresenta febre com duração máxima de 7 dias, acompanhada de, pelo menos, dois dos seguintes sintomas: cefaleia, dor retro-orbital, mialgia, artralgia, prostração, exantema. Também pode ser considerado caso suspeito toda criança proveniente ou residente em área com transmissão de dengue, com quadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 dias e sem foco de infecção aparente.
- II.** Febre do Chikungunya: paciente com febre de início súbito, abaixo de 37°C e artralgia ou artrite intensa de início agudo não explicado por outras condições, sendo residentes ou visitantes de áreas endêmicas ou epidêmicas até duas semanas antes do início dos sintomas, ou que tenha vínculo epidemiológico com caso confirmado.
- III.** Febre pelo Zika Vírus: paciente que apresente exantema máculo papular pruriginoso acompanhado de, pelo menos, dois ou mais dos seguintes sinais e sintomas: febre ou hiperêmia conjuntival sem secreção e prurido ou poliartralgia ou edema periarticular.
- IV.** Febre Amarela: indivíduo com quadro febril agudo (até 7 dias), de início súbito, acompanhado de icterícia e/ou manifestações hemorrágicas, residente em (ou procedente de) área de risco para febre amarela ou de locais com ocorrência de epizootia confirmada em primatas não humanos ou isolamento de vírus em mosquitos vetores, nos últimos 15 dias, não vacinado contra febre amarela ou com estado vacinal ignorado.

V. Febre do Chikungunya: paciente com febre de início súbito maior que 38,5°C e artralgia ou artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, sendo residente ou tendo visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até duas semanas antes do início dos sintomas ou que tenha vínculo epidemiológico com caso confirmado.

**Estão CORRETAS**

- A) I, III e IV, apenas.
- B) I, II e V, apenas.
- C) II e V, apenas.
- D) I, III e V, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

**50. A Hanseníase é uma infecção granulomatosa crônica, causada pelo bacilo *Mycobacterium leprae*. Apresenta alta contagiosidade e baixa morbidade. O Brasil ocupa o segundo lugar em número absoluto de casos, perdendo apenas para a Índia. É o único país, que não atingiu a meta de eliminação da doença como problema de saúde pública. Acredita-se que a transmissão da hanseníase ocorra pelo contato íntimo e prolongado de indivíduo suscetível com paciente bacilífero, através da inalação de bacilos. A melhor forma de cessar a transmissão é o diagnóstico e o tratamento precoce.**

**Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:**

- I. A Hanseníase indeterminada ou forma inicial evolui espontaneamente para a cura na maioria dos casos ou evolui para as formas polarizadas em cerca de 25% dos casos, o que pode ocorrer no prazo de 3 a 5 anos. Geralmente, encontra-se apenas uma lesão, de cor mais clara que a pele normal, com distúrbio da sensibilidade, podendo ser acompanhada de alopecia e/ou anidrose.
- II. As lesões da hanseníase geralmente iniciam com hiperestesia local, que evoluem para a diminuição ou a ausência de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil.
- III. O exame neurológico compreende a inspeção, palpação/percussão, avaliação funcional dos nervos. Os nervos da face como o Trígêmeo e o Mediano podem causar alterações na face, nos olhos e no nariz.
- IV. Visando ao tratamento com o esquema Poliquioterapia (PQT/OMS) na forma Paucibacilar, que representa casos com até sete lesões de pele, as drogas utilizadas para tratar uma pessoa adulta são: Rifampicina (RFM) com duas cápsulas de 300mg e a Dapsona (DDS) com 28 comprimidos de 100mg.
- V. Os estados reacionais ou reações hansênicas são alterações do sistema imunológico, que se exteriorizam como manifestações inflamatórias agudas e subagudas, mais frequentes nos casos multibacilar (MB). Essas reações podem ocorrer antes do diagnóstico da doença e caracterizam-se por Reação do Tipo 1 ou reação reversa (RR) e Reação do Tipo 2 ou reação de eritema nodoso hansênico (ENH).

**Estão CORRETAS**

- A) I, III e V, apenas.
- B) I, II e V, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) IV e V, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.



## **ATENÇÃO**

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo os Conhecimentos Específicos da categoria profissional do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

**BOA SORTE!**