

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1 para as questões de 01 a 05.

Margeada por piscinas naturais, a cidade tem sua denominação inspirada nas coroas que emergem nas marés baixas nos bancos de areia entre a beira-mar e os corais.

Em homenagem aos índios caetés, povo nativo da região, o município era chamado *Puiraçu*, termo proveniente do tupi antigo *po'yrusu*, que significa "miçangas grandes" (*po'yra*, "miçanga" + *usu*, "grande").^[5] Apenas em 31 de dezembro de 1958, com a publicação da Lei 3 340, a cidade passou a ser considerada um município autônomo, recebendo o nome de São José da Coroa Grande.

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=textos+s%C3%A3o+jos%C3%A9+coroa+grande>. Acesso em 18/11/2022

01. No trecho “MARGEADA por piscinas naturais, a cidade tem sua denominação...”. o termo destacado em maiúscula concorda com “cidade”.

Se o termo “cidade” fosse substituído por “os estados e as cidades”, estaria CORRETO o trecho indicado na alternativa

- A) Margeadas por piscinas naturais...
 B) Margeado por piscinas naturais...
 C) Margeados por piscinas naturais...
 D) Margeada por piscinas naturais...
 E) Margeando por piscinas naturais...

02. Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa CORRETA para o acento do termo destacado.

- A) “Em homenagem aos índios CAETÉS...” – o acento se justifica por se tratar de termo paroxítono terminada em “s”.
 B) “...o MUNICÍPIO era chamado *Puiraçu*...” – o termo é acentuado por ser proparoxítona terminada em ditongo.
 C) “...a cidade passou a ser considerada um município AUTÔNOMO...” – a tonicidade do termo destacado recai na penúltima sílaba.
 D) “...emergem nas MARÉS baixas nos bancos de areia...” – o termo destacado obedece à mesma regra gramatical do termo “caetés”.
 E) Nos trechos “ Em homenagem aos ÍNDIOS caetés” e “...a cidade passou a ser considerada um MUNICÍPIO autônomo...”, os termos destacados não obedecem à mesma regra de acentuação.

03. Sobre o trecho abaixo:

“Em homenagem aos índios caetés, povo nativo da região, o município era chamado *Puiraçu*, termo proveniente do tupi antigo *po'yrusu*,...”

Em relação às vírgulas nele existentes, está CORRETO o que se afirma em

- A) As duas primeiras vírgulas isolam termos que invocam alguém.
 B) A terceira vírgula separa termos que exprimem circunstância modal.
 C) As duas primeiras vírgulas separam termos intercalados.
 D) A segunda vírgula é facultativa.
 E) Todas as vírgulas isolam termos que explicam o seu antecedente.

04. Numere a segunda coluna (B) de acordo com a primeira (A), observando os termos destacados e classificando-os conforme o número de sílabas.

- | A | B |
|----------------|--|
| 1. Monossílaba | () “...inspirada nas COROAS que emergem...” |
| 2. Dissílaba | () “... a ser considerada um município AUTÔNOMO.” |
| 3. Trissílaba | () “...o nome de SÃO José da Coroa Grande.” |
| 4. Polissílaba | () “...entre a beira-mar e os CORAIS...” |

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 3/4/1/2 B) 3/2/4/1 C) 2/3/1/4 D) 3/4/2/1 E) 2/1/3/4

05. Ao declarar no texto “...inspirada nas coroas que emergem nas marés baixas”, o autor quis dizer que

- A) as marés baixas impediam o surgimento das coroas.
- B) nas marés altas, aumentava-se a quantidade das coroas.
- C) em qualquer tipo de maré, as coroas se sobressaíam e encantavam os banhistas.
- D) as marés baixas favoreciam o aparecimento das coroas.
- E) quando surgiam, as coroas ocultavam os corais.

Texto 02 para as questões de 06 a 08.

Está fazendo um dia lindo de outono. A praia estava cheia de um vento bom, de uma liberdade. E eu estava só. E naqueles momentos não precisava de ninguém. Preciso aprender a não precisar de ninguém. É difícil, porque preciso repartir com alguém o que sinto. O mar estava calmo. Eu também. Mas à espreita, em suspeita. Como se essa calma não pudesse durar. Algo está sempre por acontecer. O imprevisto me fascina.

Clarice Lispector. Disponível em: https://www.pensador.com/texto_de_praias/. Acesso em 18/11/2023

06. No trecho “A praia estava cheia de um vento bom, de uma liberdade.”, a vírgula foi empregada

- A) mas poderia ser retirada, e isso não caracterizaria desvio gramatical.
- B) e poderia também ser substituída pelo conectivo “e”, embora isso gerasse mudança de sentido ao texto.
- C) para isolar elementos de mesma função sintática.
- D) e poderia também ser substituída pelo conectivo “mas”, sem causar prejuízo ao sentido do texto.
- E) corretamente, mas também estaria correto substituí-la por dois pontos nesse contexto.

07. No tocante a Classes de Palavras, assinale a alternativa CORRETA.

- A) “E naqueles momentos não precisava de NINGUÉM.” – o termo destacado é classificado como pronome demonstrativo.
- B) “...repartir com alguém O que sinto.” – o termo destacado se classifica como um artigo que se refere a alguém do gênero masculino.
- C) “O IMPREVISTO me fascina.” – o termo destacado caracteriza o termo a que se refere, classificado como adjetivo.
- D) “...repartir com alguém o QUE sinto.” – o termo destacado se classifica como conjunção integrante.
- E) “E eu estava SÓ.” – o termo destacado é variável apenas em número, classificado como adjetivo.

08. Assinale a alternativa cujo trecho extraído do texto 02, mantendo-se o tempo verbal e sendo o sujeito “NÓS”, NÃO apresenta incorreção quanto à concordância.

- A) E nós estávamos só.
- B) E naqueles momentos não precisáveis de ninguém.
- C) É difícil, porque precisamos repartir com alguém o que sentimos.
- D) O imprevisto te fascina.
- E) Precisamos aprendermos a não precisar de ninguém.

Texto 03 para as questões 09 e 10.

Ficar na praia observando o mar parece que nos traz paz, é como se o tempo parasse, os problemas sumissem e sobrasse apenas você e o mar. Por um momento, você até tem a impressão de que tudo ficará bem para sempre.

Disponível em: <https://www.mensagenscomamor.com/textos-sobre-praia>. Acesso em : 19./11/2022

09. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Por um momento, você até tem a impressão de que tudo ficará bem para sempre.”

É CORRETO afirmar que

- A) é um período composto por duas orações subordinadas.
- B) o período é simples, e a oração é denominada absoluta.
- C) o período é composto por três orações, sendo duas coordenadas e uma subordinada.
- D) no período, existem duas orações, uma principal e a outra subordinada substantiva.
- E) as duas orações existentes no período são coordenadas assindéticas.

10. Sobre Concordância Verbal, assinale a alternativa CORRETA.

- A) "...é como se o tempo parasse..." – se o termo "tempo" fosse substituído por "horas", o verbo se manteria inalterado em sua grafia.
- B) "...e sobrasse apenas você e o mar" – estaria também correto nesse contexto se o verbo estivesse flexionado no plural concordando com ambos os sujeitos.
- C) "Por um momento, VOCÊ até tem a impressão..." – se o pronome destacado estivesse no plural, estaria correto o seguinte trecho: vocês até têm a impressão.
- D) "de que TUDO ficará bem para sempre." – se o pronome destacado fosse substituído por "as coisas", estaria correto o seguinte trecho: de que as coisas ficasse bem para sempre.
- E) "...os PROBLEMAS sumissem..." – se o termo destacado fosse substituído por "dificuldade", o verbo se manteria inalterado em sua grafia.

Texto 04 para as questões de 11 a 16**A DOR QUE DÓI MAIS**

Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um tapa, um soco, um pontapé doem. Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim. Mas o que mais dói é saudade.

Saudade de um irmão que mora longe. Saudade de uma cachoeira da infância. Saudade do gosto de uma fruta que não se encontra mais. Saudade do pai que já morreu. Saudade de um amigo imaginário que nunca existiu. Saudade de uma cidade. Saudade da gente mesmo, quando se tinha mais audácia e menos cabelos brancos. Doem essas saudades todas.

Disponível em: https://www.pensador.com/textos_de_martha_medeiros/Acesso em 18/11/2022.

11. Ao se utilizar do trecho "Mas o que mais dói é saudade", a autora pretendeu dizer que

- A) são várias as dores do mundo, e a saudade é a mais desprezível.
- B) a dor da saudade é amena e suave.
- C) no mundo, sentir dor faz parte da vida humana, mas a saudade é a mais suportável.
- D) de todas as dores vividas pelo indivíduo, nenhuma supera a da saudade.
- E) nem toda pessoa vive a dor da saudade.

12. Assinale a alternativa cuja justificativa em relação aos sinais de Pontuação está INCORRETA.

- A) "Um tapa, um soco, um pontapé doem." – as vírgulas isolam elementos de mesma função sintática.
- B) A última vírgula do texto 04 isola uma oração subordinada.
- C) "Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim." – todas as vírgulas separam orações coordenadas assindéticas.
- D) O ponto final após o termo "rim" poderia ser substituído por uma vírgula e isso não caracterizaria desvio gramatical.
- E) "dói cólica, cárie e pedra no rim." – a vírgula isola elementos de mesma função sintática.

13. No tocante à análise sintática, assinale a alternativa CORRETA.

- A) "Doem essas saudades todas." - o verbo exige complemento não regido de preposição, "essas saudades todas".
- B) "Dói bater a cabeça NA QUINA DA MESA." – os termos destacados funcionam como adjunto adverbial que exprime circunstância de lugar.
- C) "Um tapa, um soco, um pontapé doem." – o sujeito é composto por dois núcleos.
- D) "Saudade DE UMA CIDADE" - os termos destacados se classificam como adjunto adverbial que exprime circunstância de lugar.
- E) "...quando se tinha MAIS AUDÁCIA E MENOS CABELOS BRANCOS." – os termos destacados completam o sentido do verbo "ter".

14. Analise as afirmativas abaixo sobre Acentuação e assinale a que NÃO apresenta erro em sua justificativa.

- A) "Um tapa, um soco, um PONTAPÉ doem." – o acento se justifica pelo fato de o termo ser um paroxítono terminada em "e".
- B) "... dói CÓLICA, CÁRIE e pedra no rim." – ambos os termos destacados obedecem à mesma regra de acentuação.
- C) "Saudade de um amigo IMAGINÁRIO..." – o termo destacado é acentuado por ser paroxítona terminada em hiato.
- D) "...quando se tinha mais AUDÁCIA..." – o acento se justifica pela presença do hiato.
- E) Em "dói cólica, CÁRIE e pedra no rim." e "saudade de um amigo IMAGINÁRIO...", os termos destacados seguem a mesma regra de acentuação.

15. Assinale a alternativa que apresenta uma justifica INCORRETA em relação a Classes de Palavras.

- A) “Dói bater a cabeça na QUINA da mesa.” – o termo destacado é classificado como substantivo comum.
 B) “MAS o que mais dói é saudade.” – o conectivo destacado exprime ideia de causalidade.
 C) “Saudade de um irmão QUE mora longe.” – o termo destacado se refere ao seu antecedente, daí ser classificado como pronome relativo.
 D) “...de uma fruta que não se encontra MAIS.” – o termo destacado é palavra invariável, classificado como advérbio.
 E) “MAS o que mais dói é saudade.” – o termo destacado poderia ser substituído por “porém”, e o sentido do texto se manteria inalterado.

16. Em qual alternativa abaixo, o termo em parênteses NÃO se grafa da mesma forma que o termo destacado? (Atente para a letra em negrito)

- A) “Bater com o QUEIXO no chão dói.” (mexilhão)
 B) “Torcer o TORNOZELO dói.” (azedume)
 C) “Saudade de um irmão que mora LONGE.” (alforge)
 D) “...quando se tinha mais AUDÁCIA...” (veracidade)
 E) “Dói bater a cabeça na quina da MESA...” (lisura)

Texto 05 para a questão 17.

17. Observe a charge abaixo:



Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/figuras-de-linguagem/> Acesso em 19/11/2022

Nessa charge, existe uma Figura de Linguagem. Assinale a alternativa que a indica.

- A) Elipse. B) Metáfora. C) Hipérbole. D) Eufemismo. E) Metonímia.

Texto 06 para as questões de 18 a 20.

Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas, se você tiver alegria fora de casa e viver uma guerra na sua família, a infelicidade será sua amiga. Augusto Cury.

Disponível em: <https://www.refletirpararefletir.com.br/frases-sobre-familia>. Acesso em 19/11/2022

18. Após a leitura do texto, conclui-se que para Cury

- A) a família é fortemente responsável pela felicidade de cada um.
 B) indiferentemente de local, a família pouco contribui para haver paz nas pessoas.
 C) estar em família sempre gera momentos de paz.
 D) o trabalho é responsável grandemente pela infelicidade humana.
 E) indivíduo pode ser feliz, independentemente de viver bem ou não com sua família.

19. Observe o trecho abaixo:

“Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz.”

É CORRETO afirmar que se trata de um período composto, nele existindo

- A) duas orações, apenas.
 B) três orações, apenas.
 C) quatro orações, apenas.
 D) três orações, apenas, sendo uma principal e duas coordenadas.
 E) quatro orações, apenas, sendo uma principal e três subordinadas.

20. Se o texto 06 fosse iniciado com o pronome “VOCÊS”, mantendo-se o mesmo tempo verbal, estaria **CORRETO** o que se indica na alternativa

- A) Se vocês passassem por uma guerra no trabalho.
 B) Mas terão paz quando chegarem em casa.
 C) Seríeis um ser humano feliz.
 D) Mas se vocês tiverem alegria fora de casa.
 E) E viverão uma guerra na sua família.

CONHECIMENTOS DE SUS

Responda as questões de 21 a 23, de acordo com a legenda a seguir:

- (A) Apenas as afirmativas A e C estão corretas.
 (B) Apenas as afirmativas B e C estão corretas.
 (C) Apenas a afirmativa C está correta.
 (D) Todas as afirmativas estão corretas.
 (E) Todas as afirmativas estão erradas.

21. Sobre os determinantes e condicionantes da saúde-doença, analise as asserções a seguir.

- A) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, os fatores determinante e condicionantes de saúde são: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais para a saúde.
 B) O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da saúde como um fenômeno social e humano.
 C) Os determinantes sociais da saúde permitem que se identifique os fatores externos que influenciam de maneira negativa na qualidade de vida das pessoas. Eles ajudam na criação de medidas globais para redução da desigualdade.

22. A transição epidemiológica consiste na mudança do perfil de morbidade e mortalidade de uma população. Sobre a transição demográfica e epidemiológica no Brasil, analise as asserções a seguir:

- A) Os países da América do Norte e Europa já possuíam um grau de desenvolvimento social e econômico, à medida que sua população envelhecia, ou seja, os países desenvolvidos ficaram ricos antes de envelhecer, e o Brasil está envelhecendo antes de ficar rico.
 B) O fenômeno da feminização da velhice, muito comum nos países europeus, ainda não se faz presente no Brasil.
 C) Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 2019, a expectativa de vida no Brasil atingiu 76,6 anos, mas a média da população dos estados mais pobres chega a ser 8,5 anos a menos do que nas regiões mais ricas.

23. Ainda sobre a transição demográfica e epidemiológica no Brasil, analise as asserções a seguir:

- A) A pandemia da COVID-19 no Brasil levou a óbito mais de 685 mil pessoas, no entanto não conseguiu reverter a tendência de ganhos na expectativa de vida, seja por consequência direta ou indireta.
 B) O envelhecimento demográfico e o envelhecimento individual devem ser diferenciados. O primeiro é decorrente da mudança na estrutura etária da população e acontece com o aumento da proporção de pessoas consideradas jovens.
 C) O conceito de “Famíliismo” é extremamente importante para o entendimento da transição demográfica e epidemiológica e significa que é constitucional que a responsabilidade pelo cuidado das pessoas mais dependentes, incluindo crianças doentes e idosos, é da família, da sociedade e do Estado.

24. As IST são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos, transmitidas principalmente no contato sexual sem uso de preservativos. Consideradas um problema de saúde pública, estão entre as doenças mais comuns em todo o mundo.

Analise as assertivas e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () No Brasil, as bases para prevenção, diagnóstico e tratamento das IST estão bem estabelecidas, bem como seu modelo de vigilância epidemiológica, composto por notificação compulsória, serviços sentinela e estudos transversais em determinados grupos populacionais.

28. Ainda sobre os Sistemas de Informação em Saúde, analise as asserções a seguir e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O SIH/SUS, que possui dados informatizados desde 1984, foi concebido sob a lógica epidemiológica, como também, com o propósito de operar o sistema de pagamento de internação dos hospitais contratados pelo Ministério da Previdência.
- () Reúne informações de cerca de 70% dos internamentos hospitalares realizados no país, tratando-se, portanto, de grande fonte das enfermidades que requerem internação, importante para o conhecimento da situação de saúde e gestão de serviços.
- () A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou, em 2020, um conjunto de dados sobre as internações na rede privada vinculada a planos de saúde registradas por meio da Troca de Informações em Saúde Suplementar e, portanto, a partir daquele ano, as estatísticas de internações hospitalares contam os dados dos hospitais da rede privada.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V. B) V-V-F. C) F-F-F. D) F-F-V. E) F-V-F.

29. Sobre o financiamento do SUS, analise as asserções a seguir e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Temos, hoje, uma regra de cálculo do piso da saúde fortemente condicionada a variáveis cíclicas. As regras fiscais são rígidas e sobrepostas – a EC 95 congela o piso da saúde e estabelece o teto de gastos por um período de vinte anos, a partir de 2016.
- () Após seis anos de vigência da EC 95/2015, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 113, em 8 de dezembro de 2021 (EC 113/2021), que mais uma vez alterou a metodologia de cálculo do piso para aplicação em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) da União, quando alterou o período de apuração do - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que passou a ser medido/estimado entre janeiro a dezembro do ano da elaboração da peça orçamentária.
- () Pode-se afirmar que a nova metodologia (EC 113/2021) não alterou o comportamento do gasto federal em saúde e definitivamente não trouxe mudanças no financiamento do SUS, visto que a alteração do período temporal do IPCA apenas corrige monetariamente o valor do mínimo a ser destinado a ASPS pelo Ministério da Saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
B) V-V-F.
C) F-F-F.
D) F-F-V.
E) F-V-F.

30. Os gastos em saúde têm sido uma preocupação mundial diante da escassez de recursos financeiros para o atendimento das demandas em saúde.

Sobre o assunto, analise as asserções a seguir:

- I.** No Brasil, a média de gastos totais em saúde é semelhante ao índice médio (8,8% do PIB) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCED), todavia, apesar de ser um país com um sistema de saúde pública financiado pela arrecadação de impostos e outras fontes, apresenta maior participação do gasto privado.
- II.** A desigualdade entre o gasto público e o gasto privado é um traço marcante da saúde no Brasil.
- III.** Em períodos de retração ou de baixo crescimento econômico, o consumo de produtos (bens e serviços) de saúde tende a sofrer uma grande redução do que o consumo de produtos do restante da economia.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três assertivas estão corretas.
B) Apenas a assertiva I está correta.
C) Existem, apenas, duas corretas.
D) As três assertivas estão incorretas.
E) Apenas a III está correta.

35. No Brasil, os estudos acerca do NASF versam sobre a inserção de determinados núcleos profissionais no âmbito da APS e sobre as práticas de saúde desenvolvidas.

Sobre o assunto, analise as asserções a seguir e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Em algumas localidades do país, ainda se observa o predomínio de ações clínicas individuais e assistencialistas, além de práticas com fortes características dos modelos médico-assistencial e sanitaria.
- () Ainda há pouca clareza acerca das atribuições dos profissionais do NASF, além de dificuldades relacionadas à formação em saúde, que se mantém fragmentada e centrada no núcleo específico de cada profissão.
- () O Ministério da Saúde considerou, na criação do NASF, as seguintes áreas imprescindíveis para a efetivação do cuidado integral em saúde: Alimentação/Nutrição, Saúde Mental, Atividade Física e Reabilitação, sendo definidas como modalidades de atenção dos núcleos.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V. B) V-V-F. C) F-F-F. D) F-F-V. E) F-V-F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. Uma das diretrizes operacionalizadas na Política Nacional de Atenção Básica pressupõe:

“a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado”.

Assinale a alternativa que corresponde à CORRETA denominação dessa diretriz.

- A) Coordenar o cuidado.
 B) Ordenar as redes.
 C) Longitudinalidade do cuidado.
 D) Regionalização e hierarquização.
 E) Cuidado centrado na pessoa.

37. No âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica.

Em relação aos NASF-AB, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Não fazem parte da atenção básica e, por isso, constituem-se como serviços com unidades físicas independentes ou especiais.
- II.** São de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- III.** Podem ser compostos por profissional sanitaria, o qual pode reforçar as ações de apoio institucional e/ou matricial, ainda que não sejam exclusivas dele.
- IV.** Devem utilizar as Academias da Saúde como espaços que ampliam a capacidade de intervenção coletiva das equipes de atenção básica para as ações de promoção de saúde.
- V.** Devem, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes e/ou Academia da Saúde, atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus serviços.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III, IV e V.
 B) apenas II, III, IV e V.
 C) apenas I, III e V.
 D) apenas III, IV e V.
 E) apenas I, II e IV.

38. Sobre os indicadores epidemiológicos de mortalidade, leia as afirmativas abaixo:

- I.** O indicador “Anos Potenciais de Vida Perdidos” traduz o número de anos que uma pessoa, morta prematuramente, poderia ter vivido. Quanto mais elevado for o indicador, pior a situação.
- II.** O Coeficiente de Mortalidade Infantil refere-se aos óbitos de crianças nascidas vivas e falecidas antes de completarem um ano de idade, verificando-se que, nas sociedades mais desenvolvidas, os óbitos neonatais são largamente predominantes, enquanto nas regiões mais atrasadas os óbitos do período pós-neonatal representam a maior proporção da mortalidade infantil.

- III.** A Razão de Mortalidade Proporcional ou Indicador de Swaroop-Uemura corresponde à proporção de óbitos de pessoas de 50 anos ou mais, em relação ao total de óbitos, verificando-se que as regiões mais desenvolvidas apresentam altos valores para este indicador.
- IV.** As Curvas de Mortalidade Proporcional, também são conhecidas como Curvas ou Indicador de Nelson de Moraes, verificando-se que o formato da curva indica o nível sanitário da região, que pode ser classificado em: Tipo 1 (muito baixo), Tipo 2 (baixo), Tipo 3 (regular) e Tipo 4 (elevado).
- V.** O Indicador Quantitativo da Mortalidade Proporcional é uma forma de mensuração da mortalidade, também conhecido como “Indicador de Guedes”, que se baseia nas mesmas faixas etárias utilizadas no indicador de Nelson Moraes, sendo que, através de um sistema de ponderação, chega-se a um único número, que resume a mortalidade da população.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III, IV e V.
 B) apenas II, III, IV e V.
 C) apenas I, III e V.
 D) apenas III, IV e V.
 E) apenas I, II e IV.

39. Sobre as formas clínicas de Hanseníase, analise as afirmativas abaixo e coloque “V” nas Verdadeiras e “F” nas Falsas.

- () Hanseníase Indeterminada - manchas hipocrômicas sem alteração de relevo nem da textura da pele. O comprometimento sensitivo é discreto, geralmente com hipoestesia térmica apenas, mais raramente há diminuição da sensibilidade dolorosa, enquanto a sensibilidade tátil é preservada. Pode ou não haver diminuição da sudorese e rarefação de pelos nas lesões, indicando comprometimento da inervação autonômica. Não há comprometimento de nervos periféricos e, portanto, não se observam repercussões neurológicas nas mãos, pés e olhos. A quantidade de bacilos é muito pequena, indetectável pelos métodos usuais, e, via de regra, a baciloscopia é negativa.
- () Hanseníase Virchowiana - Com a evolução da doença não tratada, surgem múltiplas pápulas e nódulos cutâneos, assintomáticos e de consistência firme. As lesões de pele podem apresentar sensibilidade normal. Os nervos periféricos geralmente estão espessados difusamente e de forma simétrica, frequentemente com hipoestesia ou anestesia dos pés e mãos, além de disfunções autonômicas com hipotermia e cianose das extremidades. O diagnóstico pode ser confirmado pela baciloscopia positiva do esfregaço intradérmico, que, via de regra, revela alta carga bacilar.
- () Hanseníase Tuberculoide - As lesões da pele são placas com bordas nítidas, elevadas, geralmente eritematosas e micropapulosas, que surgem como lesões únicas ou em pequeno número. Acentuada hipoestesia ou anestesia nas lesões dermatológicas. Hipo ou anidrose. Diminuição dos pelos nas áreas afetadas. Os nervos periféricos são poupados ou apresentam-se espessados de forma localizada e assimétrica, podendo haver comprometimento intenso das funções sensitivas e motoras no território do nervo afetado. Por outro lado, pode haver áreas da pele com comprometimento sensitivo sem lesões cutâneas visíveis.
- () Hanseníase Dimorfa - As lesões mais típicas são denominadas “lesões foveolares”, com bordas internas bem definidas e uma área central de pele aparentemente poupada, enquanto as bordas externas são espalhadas, infiltradas e imprecisas. O comprometimento dos nervos periféricos geralmente é múltiplo e assimétrico, muitas vezes com espessamento, dor e choque à palpação, associados à diminuição de força muscular e hipoestesia no território correspondente, às vezes causando deformidades visíveis na face, mãos e pés, com atrofia muscular, garras nos dedos, úlceras plantares, lesões traumáticas em áreas de anestesia e alterações oculares. O *M. leprae* geralmente é encontrado em número moderado, tanto na baciloscopia do esfregaço intradérmico como em fragmentos de biópsia das lesões.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) F-V-V-F B) F-F-V-V C) F-V-F-V D) V-V-F-F E) V-V-V-V

40. Embora os exantemas virais sejam geralmente associados com doenças benignas e autolimitadas, o diagnóstico correto se faz necessário para que haja um adequado monitoramento e tratamento, assim como possibilita a adoção de medidas preventivas para os contatos suspeitos.

Sobre as doenças exantemáticas na infância, leia as afirmativas abaixo:

- I.** No sarampo, ocorrem pontos de Herman nas tonsilas, descritos como áreas cinza-azuladas, assim como, observam-se as Manchas de Koplik, que são lesões puntiformes branco-azuladas circundadas por um anel eritematoso na mucosa bucal, na altura dos segundos molares superiores.
- II.** Na rubéola, pode surgir um enantema que consiste em pápulas eritematosas no palato mole e na úvula, chamado Sinal de Forchheimer.

- () Pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, com comorbidades ou uso de antibiótico nos últimos 3 meses, podem ser tratados ambulatorialmente, tendo como opções terapêuticas a monoterapia com fluoroquinolona respiratória (levofloxacino / moxifloxacino) ou a associação de um macrolídeo + betalactâmico (penicilina ou cefalosporina).
- () Pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, previamente saudáveis, sem comorbidades e sem tratamento antimicrobiano prévio nos últimos 3 meses, podem ser tratados ambulatorialmente, tendo como opção terapêutica preferencial a monoterapia com macrolídeo.
- () Cinco comorbidades são avaliadas e consideradas como agravantes no escore denominado *Pneumonia Severity Index* (PSI): neoplasia, insuficiência cardíaca congestiva, doença cerebrovascular, doença renal e doença hepática.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) F-V-V-F B) V-V-V-F C) F-F-V-V D) V-V-F-F E) V-V-V-V

44. Assinale a alternativa INCORRETA referente às intoxicações exógenas.

- A) Nas intoxicações exógenas por paracetamol, utiliza-se como antídoto a N-acetilcisteína.
- B) Nas intoxicações exógenas por agente dicumarínico, utiliza-se como antídoto a fitomenadiona.
- C) Nas intoxicações exógenas por betabloqueadores, utiliza-se como antídoto o glucagon.
- D) Nas intoxicações exógenas por benzodiazepínicos, utiliza-se como antídoto a naloxona.
- E) Nas intoxicações exógenas por cianeto, utiliza-se como antídoto a hidroxocobalamina.

45. Assinale a alternativa INCORRETA referente ao tratamento medicamentoso da hipertensão arterial.

- A) As classes de anti-hipertensivos consideradas preferenciais para o controle da pressão arterial (PA) em monoterapia inicial são: diuréticos, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores dos receptores da angiotensina II.
- B) A espironolactona tem sido habitualmente utilizada como o quarto medicamento a ser associado aos pacientes com hipertensão arterial resistente e refratária.
- C) Os bloqueadores dos canais de cálcio do tipo “não di-hidropiridínicos” exercem efeito vasodilatador predominante, com mínima interferência na frequência cardíaca e na função sistólica.
- D) A retirada abrupta da clonidina pode provocar hipertensão rebote (crise hipertensiva) por liberação de catecolaminas na terminação sináptica.
- E) Inibidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueadores do receptor da angiotensina são formalmente contraindicados na gestação, pelo risco de malformação fetal que pode levar à insuficiência renal intrauterina.

46. Assinale a alternativa INCORRETA referente ao tratamento farmacológico da hiperglicemia no Diabetes tipo 2 (DM2).

- A) Em adultos não gestantes com diagnóstico recente de DM2, sem doença cardiovascular ou renal e sem tratamento prévio, nos quais a HbA1c esteja abaixo de 7,5%, a monoterapia com metformina está recomendada como terapia inicial para melhorar o controle da glicemia e prevenir desfechos relacionados ao diabetes.
- B) Em adultos não gestantes com diagnóstico recente de DM2, sem doença cardiovascular ou renal, assintomáticas, nos quais a HbA1c é > 9,0%, a terapia dupla com metformina associada à insulina deve ser considerada para melhorar o controle glicêmico.
- C) Inibidores do co-transportador sódio-glicose (SGLT2) têm como efeito adverso a propensão à infecção do trato geniturinário.
- D) As sulfonilureias estimulam a secreção de insulina pelas células beta pancreáticas, por meio da ligação no receptor SUR-1, diminuindo o influxo de Cálcio (Ca^{++}) e, por conseguinte, aumentando a liberação de insulina.
- E) Os níveis de vitamina B12 deverão ser avaliados anualmente após 4 anos de início da metformina em função do risco de deficiência, e repostos, se necessário.

47. Assinale a alternativa INCORRETA referente às infecções do trato urinário.

- A) Bacteriúria assintomática é caracterizada pela presença de bactérias na urina, em quantidades superiores a 100.000 unidades formadoras de colônias bacterianas por mililitro de urina (UFC/ml), na cultura de urina de jato médio, sem que haja sinais e sintomas de infecção.
- B) Identificando-se uma recorrência da infecção do trato urinário pela mesma estirpe infectante, dentro de duas semanas após o final do tratamento da infecção original, esta será classificada como reinfeção.

- C) A infecção do trato urinário é a infecção bacteriana mais comum no transplantado renal, sendo mais comumente isolados os bacilos gram-negativos entéricos e o enterococo, podendo também ser ocasionada por *Pseudomonas aeruginosa*, estafilococos e *Corynebacterium urealyticum*, além de espécies de *Candida*.
- D) Dois episódios ou mais de infecção do trato urinário em seis meses ou três episódios ou mais em um ano são classificados como infecções recorrentes.
- E) O uso de quinolonas em determinadas populações, incluindo adultos maiores de 60 anos de idade, foi associado a um risco aumentado de ruptura do tendão do calcâneo e, dentre outros efeitos colaterais potenciais, observa-se a neuropatia periférica irreversível.

48. Assinale a alternativa INCORRETA referente ao diagnóstico diferencial em pacientes com doença inflamatória intestinal.

- A) A Doença de Crohn pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, observando-se que em 75% dos pacientes com doença do intestino delgado, o íleo terminal é acometido em 90% dos casos. Contudo, o reto é frequentemente poupado na Doença de Crohn.
- B) Na Doença de Crohn, devido à ileocolite, pode ser palpada uma massa inflamatória no quadrante inferior direito do abdome, formada pelo intestino inflamado, induração do mesentério e linfonodos abdominais aumentados.
- C) Os pseudopólipos são comuns na Doença de Crohn e incomuns na retocolite ulcerativa. Nesse mesmo sentido, as fístulas e estenoses também são comuns na Doença de Crohn e raras na retocolite ulcerativa.
- D) O anticorpo anticitoplasma de neutrófilo perinuclear (p-ANCA) está presente em até 75% dos casos de retocolite ulcerativa e em até 28% dos casos de doença de Crohn.
- E) Nos casos de retocolite ulcerativa, é possível a ocorrência de manifestações extraintestinais que podem ou não ter relação com atividade de doença intestinal, como, por exemplo: artralgia/artrites, eritema nodoso, episclerite e uveíte.

49. Assinale a alternativa INCORRETA referente aos aspectos clínicos, diagnósticos e de tratamento da anemia ferropriva.

- A) No estágio de depleção de ferro (primeiro estágio), são utilizados para diagnóstico laboratorial: a própria redução do ferro sérico, o aumento da capacidade total de ligação da transferrina e a diminuição da saturação da transferrina.
- B) As manifestações clínicas da deficiência de ferro são determinadas pelos estágios de depleção de ferro, deficiência de ferro e a anemia propriamente dita (quando as repercussões clínicas e fisiológicas são aparentes).
- C) A reposição de ferro via oral é a forma preferível de tratamento na maioria das situações, pois apresenta menor custo e menor risco de efeitos adversos graves, sendo o principal composto disponível, o sulfato ferroso.
- D) A baixa contagem de reticulócitos (reticulocitopenia < 50.000/mm³ ou < 1%) indica falta de produção, que pode ser decorrente de acometimento medular (primário ou secundário), de ausência de fator estimulante (eritropoetina) ou de elementos essenciais para a eritropoiese.
- E) O sulfato ferroso é melhor absorvido, se ingerido em jejum ou uma a duas horas antes das refeições, com fruta ou suco cítrico (favorece a absorção do ferro no intestino). Se ingerido junto com leite, há prejuízo na absorção.

50. A população idosa se diferencia, por possuir uma série de características próprias com relação ao processo saúde-doença, verificando-se, nesse grupo etário, que há um aumento na incidência e na prevalência de muitas doenças, assim como um elevado índice de patologias múltiplas e crônicas. Sobre o processo de atenção à saúde do Idoso, analise as afirmativas abaixo e coloque "V" nas Verdadeiras e "F" nas Falsas.

- () Para a avaliação da função visual, pode-se usar a Escala de Atividades de Visão de Boston; o Cartão ou Tabela de Snellen ou um Cartão Portátil de Rosenbaum.
- () A avaliação da acuidade auditiva pode ser realizada através do teste do sussurro ou teste whisper.
- () Um indicador sensível de diminuição das funções cognitivas é a perda de memória recente. O teste de memória recente tem origem em um dos itens do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) ou teste de Folstein.
- () A avaliação da mobilidade funcional, cujo desempenho está relacionado com o equilíbrio, marcha e capacidade funcional do idoso, possibilitando indicar seu grau de fragilidade, pode ser realizada através do teste "Timed up and go - TUG".

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) F-V-V-F B) V-V-V-F C) F-F-V-V D) V-V-F-F E) V-V-V-V

CADERNO 29
MÉDICO PSF