

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01 para as questões de 01 a 08.

Chegar com alegria ao fim da vida depende de uma série de fatores, mas poucos são mais significativos do que a qualidade das relações humanas que desenvolvemos ao longo da nossa existência.

Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não só a saúde física mas também o cérebro. As perdas cognitivas foram muito menores entre os participantes que tinham vínculos fortes com a família, os amigos e a comunidade. Ao buscar resposta para uma pergunta complexa – “Aos 50 anos é possível determinar fatores preditivos da boa saúde aos 80? –, os pesquisadores novamente se depararam com as relações humanas. O nível de satisfação nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de colesterol. “As pessoas que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as mais saudáveis aos 80”, informa Waldinger. No outro extremo, o estudo mostrou que a solidão é tão letal quanto o tabagismo e o alcoolismo.

ARANTES, Ana Claudia Quintana. *Pra vida toda valer a pena viver*. Sextante. 2021.págs. 56-58. (Adaptado).

01. Segundo o texto 01,

- A) todo relacionamento protege a saúde física.
- B) a qualidade das relações humanas favorece um final de vida feliz.
- C) muito poucos são os fatores que determinam uma vida com qualidade.
- D) bons relacionamentos têm pouca interferência na saúde mental do indivíduo.
- E) pessoas que vivem em solidão apresentam irrelevantes problemas de saúde.

02. No tocante à Acentuação, analise os itens abaixo, observando os termos neles destacados em maiúscula.

- I. “...depende de uma ‘SÉRIE de fatores, mas poucos são mais significativos...”
- II. “Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos SATISFATÓRIOS...”
- III. “...não apenas a saúde física mas também o CÉREBRO.”
- IV. “...entre os participantes que tinham VÍNCULOS fortes com a família...”
- V. “Aos 50 anos é POSSÍVEL determinar fatores preditivos...”
- VI. “O NÍVEL de satisfação nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo...”

Assinale a alternativa que apresenta uma declaração INCORRETA.

- A) Os termos destacados nos itens I e II obedecem à mesma regra de acentuação.
- B) Os termos destacados nos itens III e IV obedecem à mesma regra de acentuação.
- C) Apenas no item I o termo destacado é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo crescente.
- D) Os termos destacados nos itens V e VI seguem a mesma regra de acentuação.
- E) O acento do termo destacado no item III se justifica por ser uma proparoxítona.

03. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Chegar com alegria ao fim da vida depende de uma série de fatores, MAS poucos são mais significativos...”

Sobre o termo destacado em maiúscula, é CORRETO afirmar que

- A) no fragmento acima, pode ser substituído pelo conectivo “porque”, sem causar prejuízo ao sentido original do texto.
- B) liga orações estabelecendo entre elas uma ideia de adição.
- C) poderia, no fragmento acima, ser substituído pelo conectivo “portanto”, e isso não acarretaria prejuízo ao sentido original do texto.
- D) liga orações estabelecendo entre elas uma ideia de conclusão.
- E) poderia, no fragmento acima, ser substituído pelo conectivo “no entanto” e o sentido original seria preservado.

04. No que concerne à Regência Verbal, observe os itens abaixo:

- I.** “Chegar com alegria ao fim da vida DEPENDE de uma série de fatores...” – o verbo destacado em maiúscula exige complemento regido de preposição.
- II.** “...que relacionamentos satisfatórios PROTEGEM não apenas a saúde física mas também o cérebro.- os complementos do verbo destacado em maiúscula vêm precedidos de preposição.
- III.** “...os pesquisadores novamente se DEPARARAM com as relações humanas.”- o verbo destacado em maiúscula exige complemento regido de preposição.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, apenas.
 B) I e II, apenas.
 C) II, apenas.
 D) I e III, apenas.
 E) I, II e III.

05. Assinale a alternativa cujo termo destacado em maiúscula está INCORRETAMENTE classificado em parênteses.

- A) “...mas POUCOS são mais significativos do que a qualidade das relações humanas...” (advérbio de intensidade)
 B) “Ao buscar resposta PARA uma pergunta complexa...” (preposição)
 C) “...era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de COLESTEROL.” (substantivo)
 D) “...que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as MAIS saudáveis aos 80.” (advérbio de intensidade)
 E) “...o estudo mostrou que a solidão é tão LETAL...” (adjetivo)

06. Observe os itens abaixo:

- I.** “...mostrou que relacionamentos satisfatórios PROTEGEM não apenas a saúde física...” – como o termo destacado, escreve-se também “fuligem”.
- II.** “...do que, por exemplo, as TAXAS de colesterol...” – como o termo destacado, escreve-se também “faxada”.
- III.** “Aos 50 anos é POSSÍVEL determinar fatores preditivos da boa saúde aos 80?” – grafa-se também como o termo destacado “assíduo”
- IV.** “...os PESQUISADORES novamente se depararam com as relações humanas.” – como o termo destacado, escreve-se também “paralisar”;
- V.** “O nível de SATISFAÇÃO nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde.” – como termo destacado, grafa-se também “intenção”.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) III e V, apenas.
 B) I, III, IV e V, apenas.
 C) I e V, apenas.
 D) II, IV e V, apenas.
 E) I, II, III, IV e V.

07. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não só a saúde física mas também o cérebro.”

Sobre esse fragmento, é CORRETO afirmar que

- A) nele existem apenas duas orações, uma principal e a outra subordinada adverbial.
 B) nele existem três orações, sendo uma delas subordinada adverbial que exprime circunstância de causalidade.
 C) o conectivo “não só ...mas também” liga orações estabelecendo entre elas uma relação de oposição.
 D) “um estudo realizado em Harvard” inicia o período e se classifica como oração principal.
 E) as orações que compõem o período são assindéticas.

08. Observe o fragmento de texto abaixo:

“...os PESQUISADORES novamente se depararam com as relações humanas.”

Se o termo destacado em maiúscula estivesse no singular, mantendo-se o tempo verbal, estaria **CORRETO** o que se indica na alternativa

- A) O pesquisador novamente se depararia com as relações humanas.
- B) O pesquisador novamente se deparou com as relações humanas.
- C) O pesquisador novamente se depara com as relações humanas.
- D) Se o pesquisador novamente se deparasse com as relações humanas.
- E) Quando o pesquisador novamente se deparar com as relações humanas.

09. Observe os itens abaixo:

- I. “O aprendizado é uma chuva de rejuvenescimento para o cérebro”. Ana Claudia Quintana Arantes
- II. “Talvez fosse mais sábio compreender esse processo participando das decisões em vez de apenas ser uma vítima do tempo”. Ana Claudia Quintana Arantes
- III. “Quanto melhor se conhece o particular, mais se necessita do geral”. Jacques Houli

Em que item (itens), existe linguagem conotativa?

- A) Em todos.
- B) Apenas no II.
- C) Apenas no I.
- D) Apenas no III.
- E) Apenas no II e III.

Texto 02 para as questões de 10 a 16.**REFLEXÃO SOBRE O ENVELHECER**

As queixas de memória em pacientes idosos são mais insistentes em população que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas. Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidos com problemas cognitivos do que o contrário. Essa população convive com gerações diferentes, separadas por famílias e lares distintos e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si. A companhia do cônjuge de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa sob a submissão dos irmãos e filhos. A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.

Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade, embora, mesmo assim, a escolaridade não interfira na convivência do idoso com os parentes no entendimento do envelhecer, dificilmente havendo rejeição. É comum, ainda, hoje, viver mais de duas gerações em uma mesma casa: avós, filhos e netos. A convivência com o idoso é normal dentro de um contexto cultural e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece os parentes próximos e deles depende para as necessidades básicas de sobrevivência.

MARQUES, Paulo Roberto de Brito. *A Arte em conviver com a doença de Alzheimer*. EDUPE. 2006. p.38-39

10. Sobre o texto 02, assinale a alternativa que expressa uma mensagem que NÃO está nele revelada.

- A) Nas grandes cidades, existe um maior número de idosos que apresentam queixa de memória.
- B) Idosos com menos de 3 anos de escolaridade apresentam menos chances de demenciar.
- C) Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais propensos a apresentar problemas de cognição.
- D) A escolaridade não prejudica a convivência do idoso com os parentes em relação ao entendimento acerca do envelhecimento.
- E) Considera-se demente a pessoa que não reconhece os parentes próximos, deles dependendo para realizar as necessidades básicas de sobrevivência.

11. Observe os itens abaixo:

- I. “As queixas de memória em pacientes idosos são mais insistentes em população que vive nas grandes cidades.”
As queixas de memória em pacientes idosos são mais frequentes em população que habita as grandes cidades.
- II. “A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.” Sem o cônjuge, a convivência do dependente se sente prejudicada, e um lar estranho ou a casa de um parente é a triste alternativa.

III. “Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade, embora, mesmo assim, a escolaridade não interfira na convivência do idoso com os parentes no entendimento do envelhecer, dificilmente havendo rejeição.” Com menos de 3 anos de escolaridade, afigura-se menor a tendência de os idosos apresentarem demência, comparados aos com maior escolaridade. Apesar disso, a escolaridade pouco prejudica a convivência do idoso com os parentes quando se trata do envelhecimento, existindo, com uma certa frequência, rejeições.

Em que item (itens) as duas frases expressam a mesma mensagem?

- A) I e II, apenas.
 B) II, apenas.
 C) II e III, apenas.
 D) I e III, apenas.
 E) I, II e III.

12. Assinale a alternativa que apresenta uma INCORREÇÃO no tocante à Concordância.

- A) “...que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas.” - estaria também correta a seguinte construção : que vive nas grandes cidades, com múltiplos demandas e estímulos.
 B) “Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidos com problemas cognitivos do que o contrário.” - se o termo “idosos” estivesse no feminino, estaria também correta a construção: Idosas com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidas com problemas cognitivos do que o contrário.
 C) “Essa população convive com gerações diferentes, SEPARADAS por famílias e lares distintos e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si.” - o termo em maiúscula concorda com o termo a que se refere, “famílias”.
 D) “...e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.” se o termo “alternativa” fosse substituído por “caminho”, estaria correto trecho: e um lar estranho ou a casa de um parente é o lúgubre caminho.
 E) “e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece os parentes próximos...” - se o termo “pessoa” estivesse no plural, estaria correta a construção: e, quando as pessoas idosas tornam-se dementes, é porque não reconhecem os parentes próximos.

13. No que concerne à Pontuação, analise os itens abaixo:

- I.** “...população que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas.” – a vírgula separa elementos de mesma função sintática.
II. “e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si.” – poderia ser retirada a vírgula após o termo “lar”, e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais de pontuação.
III. “A companhia do cônjuge de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa sob a submissão dos irmãos e filhos.” – poderia haver uma vírgula após o termo “alternativa”, e isso não seria considerado uma incorreção no que se refere às normas gramaticais de pontuação.
IV. “...e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece...” – neste caso, as vírgulas são facultativas.
V. “Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade.” – poderia haver uma vírgula após o verbo “demenciar”, e isso não caracterizaria desobediência aos padrões gramaticais vigentes de pontuação.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I e III, apenas.
 B) II, III e IV, apenas.
 C) III, apenas.
 D) I, apenas.
 E) II e V, apenas.

14. Em que alternativa os termos destacados em maiúscula estão sintaticamente classificados de forma CORRETA entre parênteses?

- A) “As queixas de memória em pacientes idosos são MAIS INSISTENTES...” (objeto direto)
 B) “que vive NAS GRANDES CIDADES, com múltiplos estímulos e demandas...” (objeto indireto)
 C) “Essa população convive COM GERAÇÕES DIFERENTES...” (complemento nominal.)
 D) “...dificilmente havendo REJEIÇÃO.” (sujeito)
 E) “...é porque não reconhece OS PARENTES PRÓXIMOS...” (objeto direto)

15. Observe os termos destacados em maiúscula e classifique-os numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.

1. Substantivo	()	“As queixas de memória em pacientes idosos são mais INSISTENTES...”
2. Adjetivo	()	“Idosos com baixa escolaridade E sexo feminino são mais atingidos...”
3. Conjunção	()	“Essa população convive com gerações diferentes, separadas POR famílias e lares distintos...”
4. Preposição	()	A companhia do CÔNJUGE de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa...”
5. Pronome	()	“...têm mais propensão a DEMENCIAR do que os com maior escolaridade...”
6. Verbo	()	“...cada qual cuida de SI.”

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 2/4/3/1/6/5
 B) 2/3/4/6/1/5
 C) 1/3/4/2/6/5
 D) 1/3/4/2/5/6
 E) 2/3/4/1/6/5

16. Observe o trecho abaixo:

“A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.”

Sobre esse trecho, é CORRETO afirmar que

- A) se trata de um período composto por orações coordenadas assindéticas.
 B) nele existem 3 orações, sendo uma principal e duas subordinadas.
 C) se trata de um período composto por coordenação.
 D) nele, a oração “e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa” é introduzida por um conectivo que liga orações estabelecendo uma relação de oposição.
 E) a oração “A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente..” é classificada como oração principal.

17. Leia o trecho abaixo:

Uma pessoa pode ter uma infância triste e mesmo assim chegar a ser muito feliz na maturidade... Da mesma forma pode nascer num berço de ouro e sentir-se enjaulada pelo resto da vida. (Charles Chaplin)

Sobre esse trecho, Chaplin se utilizou, em algum momento, de uma linguagem conotativa. Assinale a alternativa que apresenta um termo que indica conotação.

- A) Infância.
 B) Maturidade.
 C) Berço.
 D) Enjaulada.
 E) Resto.

18. Sobre as Funções da Linguagem, analise o texto abaixo:

“Os médicos recomendam uma alimentação saudável e a realização de exercício físico diário.”

Trata-se de um texto cuja linguagem tem a função

- A) expressiva ou emotiva.
 B) conativa ou apelativa.
 C) poética.
 D) referencial ou denotativa.
 E) fática.

19. Observe o texto abaixo:

Algoritmo
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Algoritmo</u> • Exemplo: receita de pão - Obter os ingredientes - Misturar os ingredientes - Aguardar o crescimento da massa - colocar no forno por 35 minutos - Retirar do forno

Trata-se de um texto

- A) Injuntivo. B) Descritivo. C) Dissertativo. D) Narrativo. E) Expositivo.

Texto 03 para a questão 20.

<p>“Vós, que sofreis, porque amais, amai ainda mais. Morrer de amor é viver dele.” Victor Hugo. Disponível em https://www.pensador.com/frases_sobre_a_vida/ Acesso em 28 de março de 2023.</p>
--

Se o sujeito fosse permutado para “tu”, estaria CORRETO o que se indica na alternativa

- A) Tu que sofrestes, porque amastes, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 B) Tu que sofres, porque amas, ama ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 C) Tu que sofrerás, porque amareis, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 D) Tu que sofres, porque amastes, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 E) Tu que sofrias, porque amáveis, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.

CONHECIMENTOS DO SUS

21. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. No processo histórico de implantação, com a expansão do antigo Programa Saúde da Família (PSF), que se consolidou como a estratégia prioritária para reorganização da atenção, foi enunciado como ESF na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) no ano de

- A) 1991. B) 1994. C) 1998. D) 2002. E) 2006.

22. De acordo com a PORTARIA GM/MS Nº 3.418, DE 31 DE AGOSTO DE 2022, que consolida a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|--|
| <p>I. Doença de Creutzfeldt-Jakob
 II. Toxoplasmose congênita
 III. Violência doméstica
 IV. Leptospirose
 V. Óbito infantil</p> |
|--|

Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças e agravos de notificação SEMANAL.

- A) Todos os itens estão corretos.
 B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
 C) Existem, apenas, três itens corretos.
 D) Existem, apenas, dois itens corretos.
 E) Existe, apenas, um item correto.

23. As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. O Estado de Pernambuco foi pioneiro na criação do plano estadual específico para o enfrentamento das doenças negligenciadas (Programa Sanar), considerado o berço de importantes nomes históricos da luta contra a fome e a pobreza.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|----------------------|
| I. Filariose |
| II. Tuberculose |
| III. Esquistossomose |
| IV. Ascaridíase |
| V. Tracoma |

Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças negligenciadas no Estado de Pernambuco.

- A) Todos os itens estão corretos.
B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
C) Existem, apenas, três itens corretos.
D) Existem, apenas, dois itens corretos.
E) Existe, apenas, um item correto.

24. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída pela PORTARIA N° 1.823, DE AGOSTO DE 2012, tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|----------------------|
| I. Universalidade |
| II. Integralidade |
| III. Equidade |
| IV. Prevenção |
| V. Seguridade social |

Assinale a alternativa em que são considerados os princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

- A) Todos os itens estão corretos.
B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
C) Existem, apenas, três itens corretos.
D) Existem, apenas, dois itens corretos.
E) Existe, apenas, um item correto.

25. Em 1988, a Constituição Federal definiu a saúde como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado, criando o Sistema Único de Saúde (SUS). Posteriormente, o SUS também foi regulamentado pela Lei no 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre

- A) a vigilância epidemiológica.
B) a gestão participativa no SUS.
C) as comissões intergestores Tripartite.
D) a Norma Operacional Básica do SUS.
E) a complementariedade dos serviços privados.

26. O Ministério da Saúde através dos Módulos da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, demonstram que aproximadamente 1 milhão de pessoas afirmaram ter diagnóstico médico de Infecção Sexualmente Transmissível (IST) ao longo do ano, o que corresponde a 0,6% da população com 18 anos de idade ou mais.

Sobre o Linfogranuloma Venéreo, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A fase terciária caracteriza-se por adenite inguinal, geralmente unilateral, firme e pouco dolorosa (bubão), que pode ser acompanhada de febre e mal-estar.
B) Possui como agente etiológico a *Klebsiella granulomatis*, dos sorotipos L1 e L2.
C) No Brasil, é caracterizada como uma doença de notificação compulsória.
D) Possui período de incubação de 1 a 3 semanas após o contato sexual.
E) Tem como tratamento de primeira escolha a Doxiciclina 100mg, via oral, a cada 12h, por no mínimo 7 dias.

27. A promoção da saúde vem sendo discutida desde o processo de redemocratização do Brasil, e a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), em seu processo de implementação nas várias esferas de gestão do SUS, vem para provocar mudanças nos modos de gestão do trabalho em saúde. Sobre a PNPS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tem como uma de suas diretrizes o estímulo à cooperação e à articulação intrasetorial e intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde.
- B) Tem como objetivo geral promover processos de educação, de formação profissional e de capacitação específicos em promoção da saúde, de acordo com os princípios e os valores expressos nesta Política, para trabalhadores, gestores e cidadãos.
- C) Foi aprovada em 2006, pela Portaria nº 687 e propôs mudanças no trabalho em saúde, com vistas a promover a saúde e a qualidade de vida.
- D) Foi reformulada em 2014 pela Portaria nº 2.446, dialogando com as reflexões dos movimentos no âmbito da promoção da saúde e visando auxiliar na promoção da qualidade de vida da população brasileira.
- E) Está em conformidade com a Declaração de Adelaide (2010) e com a Declaração de Helsinque sobre Saúde em Todas as Políticas (2013).

28. Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização da assistência à saúde no Brasil. Dentre os princípios do SUS, temos um que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades, com a integração de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- A) Universalidade
- B) Controle social
- C) Resolubilidade
- D) Integralidade
- E) Equidade

29. A Lei 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, foi um marco na regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Assinale a alternativa que NÃO está descrita na Lei Orgânica da Saúde.

- A) Princípios e Diretrizes do SUS
- B) Complementariedade do setor privado
- C) Controle social
- D) Financiamento do SUS
- E) Comissões intersetoriais

30. A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria Nº 2.436 em 2017, estabeleceu a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que NÃO foi descrita como equipe de Atenção Básica para Populações Específicas desta Política.

- A) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)
- B) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF)
- C) Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena (eMSI)
- D) Equipe de Consultório na Rua (eCR)
- E) Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP)

31. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) propõe por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Assinale a alternativa que corresponde a um princípio da PNH.

- A) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- B) Clínica ampliada e compartilhada.
- C) Valorização do Trabalhador.
- D) Acolhimento.
- E) Ambiência.

32. No Brasil, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado na década de 90, com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos ocorridos em todo o território nacional e fornecer informações sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde.

Assinale a alternativa que corresponde ao documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional e essencial à coleta de dados de nascidos vivos.

- A) Certidão de Nascimento.
- B) Ficha de notificação individual.
- C) Autorização de Internação Hospitalar.
- D) Declaração de nascidos vivos.
- E) Nenhuma das alternativas.

33. Os Determinantes Sociais da Saúde abordam o contexto social e o modo como as condições sociais se expressam nas desigualdades, iniquidades e os resultados na saúde. Um dos modelos utilizados pela Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde é o modelo de Dahlgren e Whitehead, organizado em 5 níveis de camadas.

Sobre o modelo de Dahlgren e Whitehead, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O primeiro nível representa o âmbito individual; consideram-se algumas características, como idade, gênero e fatores genéticos que influenciam a saúde do indivíduo.
- B) O segundo nível representa o comportamento e os estilos de vida individuais.
- C) O terceiro nível destaca a influência das redes comunitárias e de apoio, cuja maior ou menor riqueza expressa o nível de coesão social.
- D) No quarto nível, estão representados os fatores relacionados a condições de vida e de trabalho.
- E) O quinto nível aponta os microdeterminantes relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade.

34. No Brasil, a Leptospirose é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos principalmente nas capitais e áreas metropolitanas.

Sobre a Leptospirose, analise os itens abaixo:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">I. Possui duas fases evolutivas: fase precoce (fase leptospirêmica) e fase tardia (fase imune).II. A icterícia rubínica é um sinal característico e geralmente aparece entre o 3º e o 7º dia da doença.III. Tem como agente etiológico a Bactéria helicoidal (espiroqueta) aeróbica obrigatória do gênero Leptospira.IV. Tem período de incubação de 1 a 30 dias (em média, de 5 e 14 dias).V. É doença de notificação compulsória no Brasil. |
|---|

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

35. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) foi instituída em 2002, compatibilizando as determinações das Leis Orgânicas da Saúde com as da Constituição Federal, que reconhecem aos povos indígenas suas especificidades étnicas e culturais e seus direitos territoriais.

Sobre a PNASPI, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A rede de serviços tem como base de organização serviços de saúde nas aldeias que contam com a atuação do Agente Indígena de Saúde com atividades vinculadas a um posto de saúde.
- B) Os Polos-Base se constituem na primeira referência para o Agente Indígena de Saúde que atua nas aldeias.
- C) As Casas de Saúde do Índio (Casais) são locais de recepção e apoio ao índio, que vem referenciado da aldeia/Polo-Base.
- D) Existem três tipos de Polo-Base: tipo I, II e III.
- E) O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é a unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**36. Em relação à epifisiólise do fêmur proximal, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Dentre os vários objetivos do tratamento cirúrgico, o principal é a redução do escorregamento.
- B) A condrólise ocorre somente nas situações em que há invasão da articulação pelo implante durante o ato cirúrgico.
- C) Nas lesões classificadas como instáveis, o tratamento cirúrgico através da fixação "in situ", associada à osteotomia de southwick, constitui o "padrão-ouro".
- D) A osteotomia de Dunn é realizada na base do colo femoral.
- E) Necrose avascular da epífise femoral pode ocorrer espontaneamente ou como complicação do tratamento instituído.

37. Em relação à osteomielite na infância, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A osteomielite hematogênia aguda afeta, na maioria das vezes, a região metafisária dos ossos longos.
- B) Acometimento da região epifisária e diafisária é mais comum na osteomielite subaguda, quando comparado com a osteomielite hematogênica aguda.
- C) A classificação radiográfica de Gledhill, expandida por Robert, se aplica à osteomielite subaguda e o tipo 1A tem o granuloma eosinofílico como diagnóstico diferencial.
- D) O local mais frequentemente acometido pela osteomielite crônica é o úmero proximal.
- E) Administração de antibióticos, durante o tratamento da osteomielite aguda, por um período inferior a 3 semanas, está mais relacionada à incidência de osteomielite crônica.

38. Em relação à paralisia obstétrica, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Segundo a classificação de Narakas, o tipo 3 se apresenta com sinal de Horner.
- B) Quando há contratura do membro superior, a apresentação em abdução e rotação externa é a forma mais comum.
- C) A maioria das lesões são de mau prognóstico com recuperação, apenas, em cerca de 8% das vezes.
- D) Quando não existe retorno da capacidade de flexionar ativamente o cotovelo até os primeiros 30 dias, normalmente se indica intervenção cirúrgica.
- E) Osteotomia de rotação externa do úmero está indicada nos pacientes com deformidade glenoumeral tipo V de Waters.

39. Em relação à tuberculose osteoarticular, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Acometimento do sistema musculoesquelético corresponda a cerca de 10 a 20 % dos casos de tuberculose.
- B) Acometimento da coluna corresponde a cerca de um terço da metade dos casos de tuberculose osteoarticular.
- C) Cerca de 5 % dos pacientes com tuberculose óssea apresenta acometimento pulmonar concomitante.
- D) Frequentemente a contagem de leucócitos está normal.
- E) A VHS (velocidade de hemossedimentação) costuma estar normal ou elevada.

40. Em relação aos princípios gerais na assistência aos pacientes com tumores musculoesqueléticos, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A biópsia das lesões tumorais deve ser feita, preferencialmente, antes de qualquer avaliação por exames laboratoriais e de imagem para agilizar o diagnóstico.
- B) Um trajeto intermuscular, entre dois compartimentos, é o mais adequado na realização de biópsia de uma lesão tumoral.
- C) Caso seja necessário perfurar o osso para se retirar uma amostra durante a biópsia, o formato do furo deve ser retangular ou quadrangular.
- D) Na biópsia aberta, deve-se evitar incisões transversais na pele.
- E) Durante a biópsia, caso se opte pelo uso de torniquete, a exsanguinação por compressão, com o uso de faixas elásticas por exemplo, não deve ser usada.

41. Considerando os conceitos de margem de ressecção dos tumores musculoesqueléticos, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Em um paciente com uma lesão tumoral maligna, restrita ao terço distal do fêmur, cêntrica e sem invasão da cortical óssea, a realização de uma amputação transfemoral no terço médio do fêmur se caracteriza por ser uma ressecção do tipo radical.
- B) Uma ressecção do tipo intralesional, se caracteriza por ter a pseudocápsula como margem.
- C) Em um paciente com uma lesão tumoral maligna, restrita ao terço médio do quadríceps, uma margem de ressecção que se estenda além da pseudocápsula mas que preserve a parte não acometida do músculo é considerada radical.
- D) Em um paciente com um tumor maligno, não há como se obter uma margem de ressecção do tipo radical, sem se realizar uma amputação do membro.
- E) Nas ressecções intralesionais, pode-se usar adjuvantes como fenol, nitrogênio líquido e eletrocauterização.

42. Em relação às hérnias discais lombares, decorrentes do processo degenerativo que acometem a coluna vertebral, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Qualquer grau de perda de força é indicação absoluta de cirurgia.
- B) A probabilidade de melhora dos sintomas sem cirurgia é baixa.
- C) Em uma hérnia posterolateral localizada em L3-L4, há acometimento da raiz de L3.
- D) O acometimento da raiz de L5 por uma hérnia discal, pode causar fraqueza do glúteo médio e do extensor longo do hálux.
- E) O acometimento da raiz de S1 por uma hérnia discal pode causar fraqueza dos adutores e do tríceps sural.

43. Em relação às hérnias de disco cervicais, decorrentes do processo degenerativo que acomete a coluna vertebral, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Uma hérnia cervical localizada entre C7 e T1, foraminal, costuma causar perda de força dos músculos intrínsecos da mão, por acometer a raiz de T1.
- B) Hérnias de disco cervical podem causar síndromes do neurônio motor superior e inferior, a depender da sua localização dentro do canal medular.
- C) Hérnias de disco centrais, no tratamento cirúrgico, devem ser abordadas, preferencialmente, por via posterior.
- D) A manobra de Spurling está indicada para identificação de compressão medular.
- E) Piora da dor, ao se respousar a mão sobre a cabeça com o ombro em abdução e o cotovelo em flexão, costuma ser característica de acometimento radicular por hérnia de disco cervical.

44. Em relação à poliomielite aguda, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Cerca de 20% dos pacientes infectados com o vírus da poliomielite desenvolvem sintomas neurológicos.
- B) A lesão causada pelo vírus é no corno anterior da medula espinhal.
- C) A principal via de transmissão é fecal-oral.
- D) Nos membros inferiores, o quadríceps costuma ser um dos músculos mais afetados.
- E) Nos membros superiores, o tríceps costuma ser um dos músculos mais afetados.

45. Em relação à síndrome do desfiladeiro cervicotorácico, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O teste de Adson positivo é bastante específico, estando presente em apenas 0,5 % da população assintomática.
- B) O teste de Wright é realizado para se avaliar compressão interscalênica.
- C) Existem apenas dois locais de possível compressão do plexo braquial no seu trajeto pelo desfiladeiro torácico: entre os escalenos e abaixo do peitoral menor.
- D) Na síndrome do peitoral menor, o paciente apresenta sintomas relacionados ao território de inervação do nervo ulnar.
- E) Trombose da veia axilossulclávia, associada a esforço repetitivo, é conhecida como síndrome de Paget-Schroetter.

46. Em relação às fraturas do anel pélvico do adulto, assinale a alternativa CORRETA.

- A) As fraturas expostas do anel pélvico, do tipo 1 de Jones, são rotacionalmente instáveis e verticalmente estáveis.
- B) As fraturas expostas do anel pélvico, do tipo 2 de Jones têm lesão retal ou perineal associada.
- C) Nas fraturas expostas do anel pélvico, é sempre necessário realizar desvio cirúrgico do trânsito intestinal para evitar infecção.
- D) As fraturas em compressão lateral do tipo 2 de Young e Burgess apresentam lesão em "livro-aberto" na hemipelve contralateral.
- E) As fraturas do anel pélvico expostas, do tipo 3 de Jones, apresentam lesão perineal ou retal e são instáveis biomecanicamente.

47. Em relação às fraturas do acetábulo do adulto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Dos diversos tipos de fratura de acetábulo, a fratura da parede posterior do acetábulo é o tipo mais comum, correspondendo a cerca de 25% das fraturas do acetábulo.
- B) Nas fraturas transversas do acetábulo, as incidências radiográficas em obturatriz costumam apresentar, também, fratura nos ramos isquiáticos.
- C) O sinal da " asa de gaivota " (gull wing sign) é um sinal radiográfico visto na incidência em anteroposterior do acetábulo e denota fratura impacção da porção medial do teto acetabular.
- D) Das fraturas associadas do acetábulo, a fratura em dupla coluna é a mais comum.
- E) Fraturas da parede posterior do acetábulo , acometendo , às tomografias, mais de 50% da superfície articular são instáveis.

48. Em relação às fraturas toracolombares do adulto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) De acordo com a classificação de Vaccaro (TLICS), uma fratura do tipo explosão, sem lesão neurológica e com integridade do complexo ligamentar posterior é instável, já que apresenta fragmento do corpo vertebral dentro do canal medular.
- B) De acordo com a classificação AO, as fraturas do tipo B3 são típicas de pacientes com doenças que causam anquilose da coluna.
- C) De acordo com a classificação de Vaccaro, uma fratura de corpo vertebral em distração e com lesão do complexo ligamentar posterior confirmada é instável.
- D) De acordo com a classificação AO, uma fratura do tipo A4 se caracteriza por apresentar acometimento das colunas ósseas anterior e média de Denis, além de acometimento dos dois platôs vertebrais.
- E) De acordo com a classificação AO, uma fratura do tipo B1 é puramente óssea.

49. Em relação às fraturas-luxação do pé e tornozelo do adulto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As fraturas do colo do tálus, classificadas como tipo 2 A de Hawkins, estão associadas à subluxação da articulação subtalar.
- B) As fraturas do colo do tálus, classificadas como tipo 2 B de Hawkins, estão associadas à luxação da articulação subtalar.
- C) Nas fraturas do colo do tálus classificadas como tipo 3 de Hawkins, o corpo do tálus está luxado, na maioria das vezes, posterolateralmente.
- D) De acordo com a classificação AO, as fraturas do colo do tálus são classificadas como tipo 81 B.
- E) De acordo com a classificação AO, as fraturas da cabeça do tálus são classificadas como tipo 81 A3.

50. Em relação às fraturas-luxação da coluna cervical do adulto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As fraturas do odontóide, classificadas como tipo 1 de Anderson e D'alonzo, se caracterizam por apresentarem avulsão do ligamento alar.
- B) Existe nível 1 de evidência , sugerindo que , em pacientes alertas (conscientes, orientados e sem intoxicação) , assintomáticos e sem dor ao exame físico, a realização de exame de imagem da coluna cervical para decisão sobre a retirada do colar cervical após trauma é desnecessária.
- C) De acordo com a classificação de Anderson e Montesano, para as fraturas do côndilo occipital, as fraturas impacção são do tipo 1.
- D) De acordo com a classificação de Fielding e Hawkins para as instabilidades rotatórias traumáticas entre C1 e C2, no tipo 3 há deslocamento posterior do arco de C1.
- E) De acordo com a classificação de Fielding e Hawkins para as instabilidades rotatórias traumáticas entre C1 e C2, no tipo 2 não há lesão do ligamento alar.

CADERNO 16 - MÉDICO ORTOPEDISTA