





**CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA**

**Texto 01 para as questões de 01 a 08.**

Chegar com alegria ao fim da vida depende de uma série de fatores, mas poucos são mais significativos do que a qualidade das relações humanas que desenvolvemos ao longo da nossa existência.

Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não só a saúde física mas também o cérebro. As perdas cognitivas foram muito menores entre os participantes que tinham vínculos fortes com a família, os amigos e a comunidade. Ao buscar resposta para uma pergunta complexa – “Aos 50 anos é possível determinar fatores preditivos da boa saúde aos 80? –, os pesquisadores novamente se depararam com as relações humanas. O nível de satisfação nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de colesterol. “As pessoas que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as mais saudáveis aos 80”, informa Waldinger. No outro extremo, o estudo mostrou que a solidão é tão letal quanto o tabagismo e o alcoolismo.

ARANTES, Ana Claudia Quintana. *Pra vida toda valer a pena viver*. Sextante. 2021.págs. 56-58. (Adaptado).

**01. Segundo o texto 01,**

- A) todo relacionamento protege a saúde física.
- B) a qualidade das relações humanas favorece um final de vida feliz.
- C) muito poucos são os fatores que determinam uma vida com qualidade.
- D) bons relacionamentos têm pouca interferência na saúde mental do indivíduo.
- E) pessoas que vivem em solidão apresentam irrelevantes problemas de saúde.

**02. No tocante à Acentuação, analise os itens abaixo, observando os termos neles destacados em maiúscula.**

- I. “...depende de uma ‘SÉRIE de fatores, mas poucos são mais significativos...”
- II. “Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos SATISFATÓRIOS...”
- III. “...não apenas a saúde física mas também o CÉREBRO.”
- IV. “...entre os participantes que tinham VÍNCULOS fortes com a família...”
- V. “Aos 50 anos é POSSÍVEL determinar fatores preditivos...”
- VI. “O NÍVEL de satisfação nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo...”

**Assinale a alternativa que apresenta uma declaração INCORRETA.**

- A) Os termos destacados nos itens I e II obedecem à mesma regra de acentuação.
- B) Os termos destacados nos itens III e IV obedecem à mesma regra de acentuação.
- C) Apenas no item I o termo destacado é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo crescente.
- D) Os termos destacados nos itens V e VI seguem a mesma regra de acentuação.
- E) O acento do termo destacado no item III se justifica por ser uma proparoxítona.

**03. Observe o fragmento de texto abaixo:**

“Chegar com alegria ao fim da vida depende de uma série de fatores, MAS poucos são mais significativos...”

**Sobre o termo destacado em maiúscula, é CORRETO afirmar que**

- A) no fragmento acima, pode ser substituído pelo conectivo “porque”, sem causar prejuízo ao sentido original do texto.
- B) liga orações estabelecendo entre elas uma ideia de adição.
- C) poderia, no fragmento acima, ser substituído pelo conectivo “portanto”, e isso não acarretaria prejuízo ao sentido original do texto.
- D) liga orações estabelecendo entre elas uma ideia de conclusão.
- E) poderia, no fragmento acima, ser substituído pelo conectivo “no entanto” e o sentido original seria preservado.

**04. No que concerne à Regência Verbal, observe os itens abaixo:**

- I.** “Chegar com alegria ao fim da vida DEPENDE de uma série de fatores...” – o verbo destacado em maiúscula exige complemento regido de preposição.
- II.** “...que relacionamentos satisfatórios PROTEGEM não apenas a saúde física mas também o cérebro.- os complementos do verbo destacado em maiúscula vêm precedidos de preposição.
- III.** “...os pesquisadores novamente se DEPARARAM com as relações humanas.”- o verbo destacado em maiúscula exige complemento regido de preposição.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, apenas.  
 B) I e II, apenas.  
 C) II, apenas.  
 D) I e III, apenas.  
 E) I, II e III.

**05. Assinale a alternativa cujo termo destacado em maiúscula está INCORRETAMENTE classificado em parênteses.**

- A) “...mas POUCOS são mais significativos do que a qualidade das relações humanas...” (advérbio de intensidade)  
 B) “Ao buscar resposta PARA uma pergunta complexa...” (preposição)  
 C) “...era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de COLESTEROL.” (substantivo)  
 D) “...que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as MAIS saudáveis aos 80.” (advérbio de intensidade)  
 E) “...o estudo mostrou que a solidão é tão LETAL...” (adjetivo)

**06. Observe os itens abaixo:**

- I.** “...mostrou que relacionamentos satisfatórios PROTEGEM não apenas a saúde física...” – como o termo destacado, escreve-se também “fuligem”.
- II.** “...do que, por exemplo, as TAXAS de colesterol...” – como o termo destacado, escreve-se também “faxada”.
- III.** “Aos 50 anos é POSSÍVEL determinar fatores preditivos da boa saúde aos 80?” – grafa-se também como o termo destacado “assíduo”
- IV.** “...os PESQUISADORES novamente se depararam com as relações humanas.” – como o termo destacado, escreve-se também “paralisar”;
- V.** “O nível de SATISFAÇÃO nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde.” – como termo destacado, grafa-se também “intenção”.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) III e V, apenas.  
 B) I, III, IV e V, apenas.  
 C) I e V, apenas.  
 D) II, IV e V, apenas.  
 E) I, II, III, IV e V.

**07. Observe o fragmento de texto abaixo:**

“Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não só a saúde física mas também o cérebro.”

**Sobre esse fragmento, é CORRETO afirmar que**

- A) nele existem apenas duas orações, uma principal e a outra subordinada adverbial.  
 B) nele existem três orações, sendo uma delas subordinada adverbial que exprime circunstância de causalidade.  
 C) o conectivo “não só ...mas também” liga orações estabelecendo entre elas uma relação de oposição.  
 D) “um estudo realizado em Harvard” inicia o período e se classifica como oração principal.  
 E) as orações que compõem o período são assindéticas.

**08. Observe o fragmento de texto abaixo:**

“...os PESQUISADORES novamente se depararam com as relações humanas.”

Se o termo destacado em maiúscula estivesse no singular, mantendo-se o tempo verbal, estaria **CORRETO** o que se indica na alternativa

- A) O pesquisador novamente se depararia com as relações humanas.
- B) O pesquisador novamente se deparou com as relações humanas.
- C) O pesquisador novamente se depara com as relações humanas.
- D) Se o pesquisador novamente se deparasse com as relações humanas.
- E) Quando o pesquisador novamente se deparar com as relações humanas.

**09. Observe os itens abaixo:**

- I. “O aprendizado é uma chuva de rejuvenescimento para o cérebro”. Ana Claudia Quintana Arantes
- II. “Talvez fosse mais sábio compreender esse processo participando das decisões em vez de apenas ser uma vítima do tempo”. Ana Claudia Quintana Arantes
- III. “Quanto melhor se conhece o particular, mais se necessita do geral”. Jacques Houli

Em que item (itens), existe linguagem conotativa?

- A) Em todos.
- B) Apenas no II.
- C) Apenas no I.
- D) Apenas no III.
- E) Apenas no II e III.

**Texto 02 para as questões de 10 a 16.****REFLEXÃO SOBRE O ENVELHECER**

As queixas de memória em pacientes idosos são mais insistentes em população que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas. Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidos com problemas cognitivos do que o contrário. Essa população convive com gerações diferentes, separadas por famílias e lares distintos e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si. A companhia do cônjuge de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa sob a submissão dos irmãos e filhos. A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.

Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade, embora, mesmo assim, a escolaridade não interfira na convivência do idoso com os parentes no entendimento do envelhecer, dificilmente havendo rejeição. É comum, ainda, hoje, viver mais de duas gerações em uma mesma casa: avós, filhos e netos. A convivência com o idoso é normal dentro de um contexto cultural e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece os parentes próximos e deles depende para as necessidades básicas de sobrevivência.

MARQUES, Paulo Roberto de Brito. *A Arte em conviver com a doença de Alzheimer*. EDUPE. 2006. p.38-39

**10. Sobre o texto 02, assinale a alternativa que expressa uma mensagem que NÃO está nele revelada.**

- A) Nas grandes cidades, existe um maior número de idosos que apresentam queixa de memória.
- B) Idosos com menos de 3 anos de escolaridade apresentam menos chances de demenciar.
- C) Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais propensos a apresentar problemas de cognição.
- D) A escolaridade não prejudica a convivência do idoso com os parentes em relação ao entendimento acerca do envelhecimento.
- E) Considera-se demente a pessoa que não reconhece os parentes próximos, deles dependendo para realizar as necessidades básicas de sobrevivência.

**11. Observe os itens abaixo:**

- I. “As queixas de memória em pacientes idosos são mais insistentes em população que vive nas grandes cidades.”  
As queixas de memória em pacientes idosos são mais frequentes em população que habita as grandes cidades.
- II. “A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.” Sem o cônjuge, a convivência do dependente se sente prejudicada, e um lar estranho ou a casa de um parente é a triste alternativa.

**III.** “Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade, embora, mesmo assim, a escolaridade não interfira na convivência do idoso com os parentes no entendimento do envelhecer, dificilmente havendo rejeição.” Com menos de 3 anos de escolaridade, afigura-se menor a tendência de os idosos apresentarem demência, comparados aos com maior escolaridade. Apesar disso, a escolaridade pouco prejudica a convivência do idoso com os parentes quando se trata do envelhecimento, existindo, com uma certa frequência, rejeições.

**Em que item (itens) as duas frases expressam a mesma mensagem?**

- A) I e II, apenas.  
 B) II, apenas.  
 C) II e III, apenas.  
 D) I e III, apenas.  
 E) I, II e III.

**12. Assinale a alternativa que apresenta uma INCORREÇÃO no tocante à Concordância.**

- A) “...que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas.” - estaria também correta a seguinte construção : que vive nas grandes cidades, com múltiplos demandas e estímulos.  
 B) “Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidos com problemas cognitivos do que o contrário.” - se o termo “idosos” estivesse no feminino, estaria também correta a construção: Idosas com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidas com problemas cognitivos do que o contrário.  
 C) “Essa população convive com gerações diferentes, SEPARADAS por famílias e lares distintos e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si.” - o termo em maiúscula concorda com o termo a que se refere, “famílias”.  
 D) “...e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.” se o termo “alternativa” fosse substituído por “caminho”, estaria correto trecho: e um lar estranho ou a casa de um parente é o lúgubre caminho.  
 E) “e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece os parentes próximos...” - se o termo “pessoa” estivesse no plural, estaria correta a construção: e, quando as pessoas idosas tornam-se dementes, é porque não reconhecem os parentes próximos.

**13. No que concerne à Pontuação, analise os itens abaixo:**

- I.** “...população que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas.” – a vírgula separa elementos de mesma função sintática.  
**II.** “e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si.” – poderia ser retirada a vírgula após o termo “lar”, e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais de pontuação.  
**III.** “A companhia do cônjuge de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa sob a submissão dos irmãos e filhos.” – poderia haver uma vírgula após o termo “alternativa”, e isso não seria considerado uma incorreção no que se refere às normas gramaticais de pontuação.  
**IV.** “...e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece...” – neste caso, as vírgulas são facultativas.  
**V.** “Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade.” – poderia haver uma vírgula após o verbo “demenciar”, e isso não caracterizaria desobediência aos padrões gramaticais vigentes de pontuação.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I e III, apenas.  
 B) II, III e IV, apenas.  
 C) III, apenas.  
 D) I, apenas.  
 E) II e V, apenas.

**14. Em que alternativa os termos destacados em maiúscula estão sintaticamente classificados de forma CORRETA entre parênteses?**

- A) “As queixas de memória em pacientes idosos são MAIS INSISTENTES...” (objeto direto)  
 B) “que vive NAS GRANDES CIDADES, com múltiplos estímulos e demandas...” (objeto indireto)  
 C) “Essa população convive COM GERAÇÕES DIFERENTES...” (complemento nominal.)  
 D) “...dificilmente havendo REJEIÇÃO.” (sujeito)  
 E) “...é porque não reconhece OS PARENTES PRÓXIMOS...” (objeto direto)

15. Observe os termos destacados em maiúscula e classifique-os numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.

1. Substantivo	( )	“As queixas de memória em pacientes idosos são mais INSISTENTES...”
2. Adjetivo	( )	“Idosos com baixa escolaridade E sexo feminino são mais atingidos...”
3. Conjunção	( )	“Essa população convive com gerações diferentes, separadas POR famílias e lares distintos...”
4. Preposição	( )	A companhia do CÔNJUGE de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa...”
5. Pronome	( )	“...têm mais propensão a DEMENCIAR do que os com maior escolaridade...”
6. Verbo	( )	“...cada qual cuida de SI.”

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 2/4/3/1/6/5  
 B) 2/3/4/6/1/5  
 C) 1/3/4/2/6/5  
 D) 1/3/4/2/5/6  
 E) 2/3/4/1/6/5

16. Observe o trecho abaixo:

“A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.”

Sobre esse trecho, é CORRETO afirmar que

- A) se trata de um período composto por orações coordenadas assindéticas.  
 B) nele existem 3 orações, sendo uma principal e duas subordinadas.  
 C) se trata de um período composto por coordenação.  
 D) nele, a oração “e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa” é introduzida por um conectivo que liga orações estabelecendo uma relação de oposição.  
 E) a oração “A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente..” é classificada como oração principal.

17. Leia o trecho abaixo:

Uma pessoa pode ter uma infância triste e mesmo assim chegar a ser muito feliz na maturidade... Da mesma forma pode nascer num berço de ouro e sentir-se enjaulada pelo resto da vida. (Charles Chaplin)

Sobre esse trecho, Chaplin se utilizou, em algum momento, de uma linguagem conotativa. Assinale a alternativa que apresenta um termo que indica conotação.

- A) Infância.  
 B) Maturidade.  
 C) Berço.  
 D) Enjaulada.  
 E) Resto.

18. Sobre as Funções da Linguagem, analise o texto abaixo:

“Os médicos recomendam uma alimentação saudável e a realização de exercício físico diário.”

Trata-se de um texto cuja linguagem tem a função

- A) expressiva ou emotiva.  
 B) conativa ou apelativa.  
 C) poética.  
 D) referencial ou denotativa.  
 E) fática.

19. Observe o texto abaixo:

Algoritmo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Algoritmo</u></li> <li>• Exemplo: receita de pão</li> <li>- Obter os ingredientes</li> <li>- Misturar os ingredientes</li> <li>- Aguardar o crescimento da massa</li> <li>- colocar no forno por 35 minutos</li> <li>- Retirar do forno</li> </ul>

Trata-se de um texto

- A) Injuntivo.                      B) Descritivo.                      C) Dissertativo.                      D) Narrativo.                      E) Expositivo.

Texto 03 para a questão 20.

<p>“Vós, que sofreis, porque amais, amai ainda mais. Morrer de amor é viver dele.” Victor Hugo. Disponível em <a href="https://www.pensador.com/frases_sobre_a_vida/">https://www.pensador.com/frases_sobre_a_vida/</a> Acesso em 28 de março de 2023.</p>
--

Se o sujeito fosse permutado para “tu”, estaria **CORRETO** o que se indica na alternativa

- A) Tu que sofrestes, porque amastes, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.  
 B) Tu que sofres, porque amas, ama ainda mais. Morrer de amor é viver dele.  
 C) Tu que sofrerás, porque amareis, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.  
 D) Tu que sofres, porque amastes, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.  
 E) Tu que sofrias, porque amáveis, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.

### CONHECIMENTOS DO SUS

21. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. No processo histórico de implantação, com a expansão do antigo Programa Saúde da Família (PSF), que se consolidou como a estratégia prioritária para reorganização da atenção, foi enunciado como ESF na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) no ano de

- A) 1991.                      B) 1994.                      C) 1998.                      D) 2002.                      E) 2006.

22. De acordo com a PORTARIA GM/MS Nº 3.418, DE 31 DE AGOSTO DE 2022, que consolida a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- |  |
|--|
| <p>I. Doença de Creutzfeldt-Jakob<br/>         II. Toxoplasmose congênita<br/>         III. Violência doméstica<br/>         IV. Leptospirose<br/>         V. Óbito infantil</p> |
|--|

Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças e agravos de notificação SEMANAL.

- A) Todos os itens estão corretos.  
 B) Existem, apenas, quatro itens corretos.  
 C) Existem, apenas, três itens corretos.  
 D) Existem, apenas, dois itens corretos.  
 E) Existe, apenas, um item correto.



**23. As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. O Estado de Pernambuco foi pioneiro na criação do plano estadual específico para o enfrentamento das doenças negligenciadas (Programa Sanar), considerado o berço de importantes nomes históricos da luta contra a fome e a pobreza.**

**Sobre isso, analise os itens abaixo:**

- |      |                 |
|------|-----------------|
| I.   | Filariose       |
| II.  | Tuberculose     |
| III. | Esquistossomose |
| IV.  | Ascaridíase     |
| V.   | Tracoma         |

**Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças negligenciadas no Estado de Pernambuco.**

- A) Todos os itens estão corretos.  
 B) Existem, apenas, quatro itens corretos.  
 C) Existem, apenas, três itens corretos.  
 D) Existem, apenas, dois itens corretos.  
 E) Existe, apenas, um item correto.

**24. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída pela PORTARIA Nº 1.823, AGOSTO DE 2012, tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).**

**Sobre isso, analise os itens abaixo:**

- |      |                   |
|------|-------------------|
| I.   | Universalidade    |
| II.  | Integralidade     |
| III. | Equidade          |
| IV.  | Precaução         |
| V.   | Seguridade social |

**Assinale a alternativa em que são considerados os princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.**

- A) Todos os itens estão corretos.  
 B) Existem, apenas, quatro itens corretos.  
 C) Existem, apenas, três itens corretos.  
 D) Existem, apenas, dois itens corretos.  
 E) Existe, apenas, um item correto.

**25. Em 1988, a Constituição Federal definiu a saúde como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado, criando o Sistema Único de Saúde (SUS).**

**Posteriormente, o SUS também foi regulamentado pela Lei no 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre**

- A) a vigilância epidemiológica.  
 B) a gestão participativa no SUS.  
 C) as comissões intergestores Tripartite.  
 D) a Norma Operacional Básica do SUS.  
 E) a complementariedade dos serviços privados.

**26. O Ministério da Saúde através dos Módulos da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, demonstram que aproximadamente 1 milhão de pessoas afirmaram ter diagnóstico médico de Infecção Sexualmente Transmissível (IST) ao longo do ano, o que corresponde a 0,6% da população com 18 anos de idade ou mais.**

**Sobre o Linfogranuloma Venéreo, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A fase terciária caracteriza-se por adenite inguinal, geralmente unilateral, firme e pouco dolorosa (bubão), que pode ser acompanhada de febre e mal-estar.  
 B) Possui como agente etiológico a *Klebsiella granulomatis*, dos sorotipos L1 e L2.  
 C) No Brasil, é caracterizada como uma doença de notificação compulsória.  
 D) Possui período de incubação de 1 a 3 semanas após o contato sexual.  
 E) Tem como tratamento de primeira escolha a Doxiciclina 100mg, via oral, a cada 12h, por no mínimo 7 dias.

**27. A promoção da saúde vem sendo discutida desde o processo de redemocratização do Brasil, e a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), em seu processo de implementação nas várias esferas de gestão do SUS, vem para provocar mudanças nos modos de gestão do trabalho em saúde. Sobre a PNPS, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Tem como uma de suas diretrizes o estímulo à cooperação e à articulação intrasetorial e intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde.
- B) Tem como objetivo geral promover processos de educação, de formação profissional e de capacitação específicos em promoção da saúde, de acordo com os princípios e os valores expressos nesta Política, para trabalhadores, gestores e cidadãos.
- C) Foi aprovada em 2006, pela Portaria nº 687 e propôs mudanças no trabalho em saúde, com vistas a promover a saúde e a qualidade de vida.
- D) Foi reformulada em 2014 pela Portaria nº 2.446, dialogando com as reflexões dos movimentos no âmbito da promoção da saúde e visando auxiliar na promoção da qualidade de vida da população brasileira.
- E) Está em conformidade com a Declaração de Adelaide (2010) e com a Declaração de Helsinque sobre Saúde em Todas as Políticas (2013).

**28. Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização da assistência à saúde no Brasil. Dentre os princípios do SUS, temos um que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades, com a integração de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.**

- A) Universalidade
- B) Controle social
- C) Resolubilidade
- D) Integralidade
- E) Equidade

**29. A Lei 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, foi um marco na regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Assinale a alternativa que NÃO está descrita na Lei Orgânica da Saúde.**

- A) Princípios e Diretrizes do SUS
- B) Complementariedade do setor privado
- C) Controle social
- D) Financiamento do SUS
- E) Comissões intersetoriais

**30. A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria Nº 2.436 em 2017, estabeleceu a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que NÃO foi descrita como equipe de Atenção Básica para Populações Específicas desta Política.**

- A) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)
- B) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF)
- C) Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena (eMSI)
- D) Equipe de Consultório na Rua (eCR)
- E) Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP)

**31. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) propõe por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Assinale a alternativa que corresponde a um princípio da PNH.**

- A) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- B) Clínica ampliada e compartilhada.
- C) Valorização do Trabalhador.
- D) Acolhimento.
- E) Ambiência.

**32. No Brasil, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado na década de 90, com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos ocorridos em todo o território nacional e fornecer informações sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde.**

**Assinale a alternativa que corresponde ao documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional e essencial à coleta de dados de nascidos vivos.**

- A) Certidão de Nascimento.
- B) Ficha de notificação individual.
- C) Autorização de Internação Hospitalar.
- D) Declaração de nascidos vivos.
- E) Nenhuma das alternativas.

**33. Os Determinantes Sociais da Saúde abordam o contexto social e o modo como as condições sociais se expressam nas desigualdades, iniquidades e os resultados na saúde. Um dos modelos utilizados pela Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde é o modelo de Dahlgren e Whitehead, organizado em 5 níveis de camadas.**

**Sobre o modelo de Dahlgren e Whitehead, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O primeiro nível representa o âmbito individual; consideram-se algumas características, como idade, gênero e fatores genéticos que influenciam a saúde do indivíduo.
- B) O segundo nível representa o comportamento e os estilos de vida individuais.
- C) O terceiro nível destaca a influência das redes comunitárias e de apoio, cuja maior ou menor riqueza expressa o nível de coesão social.
- D) No quarto nível, estão representados os fatores relacionados a condições de vida e de trabalho.
- E) O quinto nível aponta os microdeterminantes relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade.

**34. No Brasil, a Leptospirose é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos principalmente nas capitais e áreas metropolitanas.**

**Sobre a Leptospirose, analise os itens abaixo:**

- I. Possui duas fases evolutivas: fase precoce (fase leptospirêmica) e fase tardia (fase imune).
- II. A icterícia rubínica é um sinal característico e geralmente aparece entre o 3º e o 7º dia da doença.
- III. Tem como agente etiológico a Bactéria helicoidal (espiroqueta) aeróbica obrigatória do gênero *Leptospira*.
- IV. Tem período de incubação de 1 a 30 dias (em média, de 5 e 14 dias).
- V. É doença de notificação compulsória no Brasil.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

**35. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) foi instituída em 2002, compatibilizando as determinações das Leis Orgânicas da Saúde com as da Constituição Federal, que reconhecem aos povos indígenas suas especificidades étnicas e culturais e seus direitos territoriais.**

**Sobre a PNASPI, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A rede de serviços tem como base de organização serviços de saúde nas aldeias que contam com a atuação do Agente Indígena de Saúde com atividades vinculadas a um posto de saúde.
- B) Os Polos-Base se constituem na primeira referência para o Agente Indígena de Saúde que atua nas aldeias.
- C) As Casas de Saúde do Índio (Casais) são locais de recepção e apoio ao índio, que vem referenciado da aldeia/Polo-Base.
- D) Existem três tipos de Polo-Base: tipo I, II e III.
- E) O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é a unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS).

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**36. A criptorquidia é a anomalia genital masculina mais comumente identificada ao nascimento. Considerando sua avaliação e manejo, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A terapia hormonal é o tratamento de escolha para crianças com criptorquidia diagnosticada antes dos 6 meses de idade.
- B) O tratamento cirúrgico (orquidopexia) deve ser realizado idealmente até os 18 meses de idade.
- C) Exames de imagem estão indicados na ausência de testículo palpável ao nascimento.
- D) A orquidopexia não está indicada em pacientes pré-puberais, tendo em vista o elevado risco de câncer testicular nessa faixa etária.
- E) A orquidopexia, quando realizada na infância, elimina os riscos de desenvolvimento de câncer testicular e infertilidade na idade adulta.

**37. Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, a vacinação para o HPV está indicada**

- A) em meninos e meninas de 9 a 14 anos, por meio de 2 doses, com intervalo de 6 meses entre as doses.
- B) em homens e mulheres de 9 a 45 anos transplantados de órgãos sólidos, por meio de 2 doses, com intervalos de 6 meses entre as doses.
- C) em homens e mulheres de 9 a 45 anos transplantados de medula óssea, por meio de 3 doses (aos 0, 2 e 6 meses).
- D) em pacientes oncológicos, de 9 a 45 anos, independente do gênero, por meio de 2 doses, com intervalo de 6 meses entre as doses.
- E) em pessoas vivendo com HIV, independente da prescrição médica.

**38. O Hipogonadismo Hipogonadotrófico está associado à deficiência androgênica e infertilidade masculina. Nesses pacientes, a conduta mais adequada para a obtenção de espermatozoides no ejaculado é a seguinte:**

- A) Reposição hormonal com testosterona injetável.
- B) Reposição hormonal com testosterona gel para evitar bloqueio do eixo Hipotálamo-Hipófise-Gonadal.
- C) Citrato de clomifeno para estímulo da espermatogênese e da produção de testosterona.
- D) Uso de antioxidantes para melhora da qualidade seminal.
- E) Tratamento com Gonadotrofinas e FSH recombinante.

**39. A investigação genética no fator masculino grave faz parte da propedêutica da infertilidade masculina. Considerando os exames que podem ser solicitados na investigação, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Pacientes com oligozoospermia severa ou azoospermia não obstrutiva devem ser investigados com solicitação de cariótipo.
- B) A pesquisa de microdeleções do cromossomo Y deve ser solicitada na investigação de pacientes com azoospermia obstrutiva.
- C) A extração de espermatozoides do testículo para reprodução assistida pode ser tentada em pacientes com deleções completas na região aZFc, porém não é indicada em pacientes com deleções completas em regiões aZFa e aZFb.
- D) Pacientes com azoospermia obstrutiva por agenesia dos ductos deferentes devem ser investigados quanto à presença do gene da fibrose cística, assim como sua parceira, pelo risco de transmissão à prole.
- E) Na Síndrome de Klinefelter, é factível a realização de técnicas de captação de espermatozoides para uso em Reprodução Assistida.

**40. Paciente portador de cálculo renal, com indicação de tratamento cirúrgico, NÃO deve**

- A) obter cultura de urina antes de qualquer tratamento planejado.
- B) excluir ou tratar infecção do trato urinário antes da remoção do cálculo.
- C) receber antibioticoprofilaxia perioperatória, quando submetidos a tratamento endourológico.
- D) proceder à imediata retirada do cálculo e, em caso de infecção, iniciar antibioticoterapia no ato cirúrgico.
- E) postergar o tratamento da litíase até a resolução de um quadro de sepse urinária.

**41. Sobre a bacteriúria assintomática, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Pacientes diabéticos bem controlados, com urocultura positiva, devem receber tratamento antibiótico.
  - B) Pacientes transplantados renais, com urocultura positiva, devem receber tratamento antibiótico.
  - C) Pacientes com infecção urinária recorrente, com urocultura positiva, devem receber tratamento antibiótico.
  - D) Mulheres na pós-menopausa, com urocultura positiva, devem receber tratamento antibiótico.
  - E) Pacientes no pré-operatório de procedimentos endourológicos com violação de mucosa, apresentando urocultura positiva, devem receber tratamento antibiótico.
- 

**42. Considerando o manejo dos pacientes com quadro de bexiga neurogênica, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Antimuscarínicos, também conhecidos como beta-3 agonistas, são os medicamentos de primeira linha no tratamento da hiperatividade detrusora.
  - B) Alfabloqueadores podem ser associados aos antimuscarínicos como forma de aumentarem a resistência uretral em casos de bexiga hiperativa, auxiliando na melhora da incontinência urinária.
  - C) Em pacientes com detrusor hipoativo, parassimpaticomiméticos apresentam boa resposta terapêutica e consistem na terapia de primeira linha para essa situação clínica.
  - D) O cateterismo intermitente limpo é o tratamento mais recomendado para pacientes com detrusor hipoativo, quando não conseguem esvaziar adequadamente a bexiga.
  - E) Em pacientes com bexiga flácida, deve se dar preferência ao cateterismo uretral ou suprapúbico de demora para minimizar os riscos de infecção urinária recorrente.
- 

**43. Quanto ao manejo de pacientes com disfunção erétil, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A terapia injetável intracavernosa apresenta boas taxas de resposta e satisfação, sendo recomendada na falha da terapia oral.
  - B) Em pacientes portadores de Doença de Peyronie com deformidades acentuadas e com disfunção erétil, o uso de inibidores de fosfodiesterase tipo 5 é o tratamento mais adequado, podendo auxiliar na correção da curvatura peniana.
  - C) Os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 representam a segunda linha de tratamento para a disfunção erétil.
  - D) Na disfunção erétil refratária ao tratamento medicamentoso oral, a terapia de segunda linha indicada é o implante de prótese peniana, visto que a terapia de injeção intracavernosa não apresenta boa resposta e encontra-se em desuso.
  - E) A terapia de ondas de choque de baixa intensidade para o tratamento da disfunção erétil tem resultados semelhantes ao tratamento com medicações orais.
- 

**44. Dentre as condições abaixo, assinale a que NÃO está relacionada a um maior risco de formação de cálculo urinário.**

- A) Baixos níveis de Vitamina D
  - B) Síndrome metabólica
  - C) Síndrome de Lesch-Nyhan
  - D) Sarcoídose
  - E) Fibrose cística
- 

**45. Cálculos ureterais podem ser tratados de forma conservadora ou minimamente invasiva com procedimentos de baixa morbidade e baixo risco de complicações.**

**Sobre o manejo dos cálculos ureterais, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A colocação de cateter duplo J não é procedimento mandatório em pacientes submetidos à ureterolitripsia endoscópica.
  - B) A colocação de cateter duplo J é mandatória em pacientes submetidos à litotripsia extracorpórea por ondas de choque.
  - C) O uso de alfabloqueadores pode ser oferecido para pacientes com desconforto relacionado à presença do cateter duplo J.
  - D) O uso de alfabloqueadores pode ser oferecido como opção medicamentosa na terapia expulsiva do cálculo ureteral.
  - E) A ureterolitripsia endoscópica tem resultados superiores à litotripsia extracorpórea por ondas de choque, no que se refere à resolutividade.
-

**46. O câncer de testículo é mais comum em faixas etárias mais jovens, com elevados índices de cura, quando diagnosticados precocemente.**

**Sobre o câncer de testículo, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A orquiectomia, incluindo a secção do cordão espermático ao nível do anel inguinal externo, representa o tratamento padrão em pacientes com câncer de testículo.
- B) A cirurgia poupadora de testículo pode ser oferecida em casos de tumor em testículo único, sendo dispensável nesses pacientes a realização de biópsia de congelação no intraoperatório.
- C) A histologia predominante do câncer de testículo é o tumor de células germinativas, células produtoras de espermatozoides, sendo os seus principais tipos os seminomas e não seminomas.
- D) O teratoma testicular é um subtipo de tumor seminomatoso.
- E) Os marcadores séricos de tumor testicular são úteis para o diagnóstico, não sendo, no entanto, necessários para o seguimento após tratamento cirúrgico.

**47. Considerando a classificação da Sociedade Internacional de Patologia Urológica (ISUP/2014), assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Câncer de próstata com Escore de Gleason 7 (4+3) corresponde ao ISUP 2.
- B) Câncer de próstata com Escore de Gleason 7 (3+4) corresponde ao ISUP 2.
- C) Câncer de próstata com Escore de Gleason 8 corresponde ao ISUP 4.
- D) Câncer de próstata com Escore de Gleason 9 corresponde ao ISUP 5.
- E) Câncer de próstata com Escore de Gleason <7 corresponde ao ISUP 1.

**48. Sobre a indicação de tratamento dos pacientes com câncer de bexiga músculo-invasivo, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A terapia de preservação vesical pode ser recomendada em pacientes idosos, considerando-se o uso de escalas de comorbidades para a seleção de pacientes.
- B) A quimioterapia neoadjuvante com cisplatina aumenta a taxa de sobrevida global, independentemente do tipo de tratamento definitivo a ser adotado.
- C) A radioterapia pré-operatória aumenta a sobrevida dos pacientes submetidos à cistectomia radical.
- D) A neobexiga ortotópica não deve ser oferecida a pacientes com margens positivas na dissecação uretral durante a cistectomia radical.
- E) Em homens selecionados, pode ser oferecida a cistectomia radical com técnica de preservação da função sexual.

**49. O traumatismo genitourinário pode se apresentar com lesões diversas e com condutas que podem variar desde o tratamento conservador ao cirúrgico.**

**Sobre a melhor conduta a ser adotada nestes pacientes, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A tomografia de abdome seriada com contraste é uma importante ferramenta para avaliação e tratamento conservador do trauma renal.
- B) A angiembolização renal seletiva não deve ser indicada para pacientes com trauma renal que evoluem com instabilidade hemodinâmica.
- C) A causa mais comum da fratura peniana é a relação sexual.
- D) Lesões vesicais contusas intraperitoneais devem ser tratadas de forma conservadora com cateterismo de demora.
- E) Lesões parciais de uretra anterior podem ser tratadas com cateterismo uretral ou suprapúbico.

**50. Na presença de sintomas do trato urinário inferior (LUTS), a investigação deve incluir rotineiramente**

- A) estudo urodinâmico em mulheres com sintomas de bexiga hiperativa não complicada.
- B) estudo de imagem do trato urinário superior ou inferior em mulheres com LUTS.
- C) uretrocistografia retrógrada, em caso de indicação de tratamento cirúrgico da HPB.
- D) RNM multiparamétrica da próstata, em caso de retenção urinária aguda com cateterismo de demora e indicação de tratamento cirúrgico.
- E) USG da próstata, em caso de indicação de tratamento cirúrgico da HPB.



**CADERNO 22- MÉDICO UROLOGISTA**