

01. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos sinais de Kanavel.

- A) Edema fusiforme.
B) Dedo em semiflexão.
C) Dor na projeção da bainha flexora.
D) Dor à extensão passiva.
E) Área de flutuação definida.
-

02. Após acidente automobilístico, o paciente apresenta retorno de um do reflexos abaixo indicando o término do choque medular. Assinale-o.

- A) Babinski.
B) Abdominal superficial.
C) Patelar.
D) Cremastérico.
E) Bulbo cavernoso
-

03. Em qual dos tipos a seguir, de acordo com a classificação de Blauth, está indicado o tratamento cirúrgico com reconstrução do ligamento colateral ulnar?

- A) I B) II C) IIIB D) IV E) V
-

04. Qual das afirmações abaixo NÃO é verdadeira em relação às sindactilias?

- A) São mais frequentes no sexo masculino.
B) Ocorrem bilateralmente em 50% dos casos.
C) Trata-se de uma das diferenças congênitas mais comuns, ocorrendo em cerca de 1:2000 nascidos vivos.
D) Podem ocorrer em associação com outras anomalias do membro superior.
E) Afetam mais comumente a primeira comissura.
-

05. Paciente refere ter dado um “murro na parede” há cerca de duas horas, referindo dor e deformidade na mão direita, sendo esta a NÃO dominante.

Qual das alternativas abaixo NÃO é um critério de indicação no tratamento cirúrgico nas fraturas do Boxer?

- A) Presença clínica de desvio rotacional
B) Dominância da mão
C) Fratura exposta
D) Pseudogarra do quinto dedo
E) Angulação da fratura
-

06. Como são chamados os nódulos encontrados na região extensora dos dedos na contratura de Dupuytren?

- A) Bouchard B) Garrod C) Heberden D) Osler E) Schmorl
-

07. A técnica cirúrgica da palma aberta, utilizada no tratamento da contratura de Dupuytren, é conhecida como cirurgia de

- A) McCash. B) Goyrand. C) Moermans. D) Agee. E) McIndoe.
-

08. Na classificação de Palmer para as lesões do complexo da fibrocartilagem articular, uma lesão degenerativa com perfuração central, acrescida de condromalácia do semilunar ou cabeça da ulna, está incluída na classe

- A) 1A B) 1C C) 2C D) 2D E) 2B
-

09. De acordo com a classificação de Wassel, assinale a alternativa que corresponde a um polegar trifalângico,

- A) Tipo I B) Tipo III C) Tipo IV D) Tipo VI E) Tipo VII
-

10. Paciente portadora de síndrome do túnel do carpo, com atrofia importante da região tenar, foi submetida à cirurgia de Camitz, que se utiliza de um dos tendões abaixo. Assinale-o.

- A) Flexor superficial do dedo mínimo.
- B) Flexor superficial do dedo anular.
- C) Palmar longo.
- D) Flexor radial do carpo.
- E) Flexor ulnar do carpo(hemi-tendão).

11. Dos tumores ósseos, qual o mais comumente encontrado na mão?

- A) Encondroma
- B) Condrossarcoma
- C) Osteblastoma
- D) Osteocondroma
- E) Tumor de células gigantes

12. No tratamento da tenossinovite de De Quervain, uma das causas da persistência do quadro de dor pode ser atribuída a um dos itens abaixo. Assinale-o.

- A) Abordagem cirúrgica com incisão de acesso longitudinal ao primeiro túnel.
- B) Não ressecção de tendões extranumerários.
- C) Abordagem cirúrgica com incisão transversal ao primeiro túnel.
- D) Não identificação de subcompartimento no primeiro túnel com a liberação do extensor curto do polegar.
- E) Não realização de zetaplastia e fechamento do retináculo.

13. Qual exame de imagem deve ser solicitado para o seguimento de uma fratura de escafoide e para verificar sua consolidação?

- A) Radiografia simples
- B) Ressonância magnética sem contraste
- C) Ressonância magnética com contraste
- D) Tomografia computadorizada
- E) Cintilografia óssea

14. Como deve ser realizada a incidência radiográfica para a medição da variação ulnar?

- A) PA de punho com abdução do ombro, flexão do cotovelo em 90° e rotação neutra do antebraço
- B) AP de punho com cotovelo em flexão
- C) PA de punho com cotovelo em extensão
- D) PA de punho com desvio radial e rotação neutra do antebraço
- E) AP de punho com desvio ulnar

15. São aspectos a serem observados quando se verifica a viabilidade de um músculo ao se realizar um desbridamento os citados abaixo, EXCETO:

- A) Contratilidade.
- B) Coloração.
- C) Consistência.
- D) Sangramento.
- E) Presença de secreção purulenta.

16. A imagem em gota de lágrima é observada na incidência em _____ do punho e corresponde à(a) _____. Assinale a alternativa cujos termos preenchem CORRETAMENTE as lacunas acima.

- A) Perfil / projeção volar da fossa do semilunar.
- B) Perfil/projeção volar da fossa do escafoide.
- C) PA / estiloide radial.
- D) PA/estiloide da ulna.
- E) Perfil/projeção dorsal da fossa do escafoide.

26. Qual das opções NÃO corresponde a um dos achados clínicos da síndrome de Horner?

- A) Enoftalmia
B) Anidrose
C) Edema da mucosa nasal
D) Anisocoria
E) Ptose palpebral
-

27. A síndrome de Wartenberg ocorre por uma compressão do(s)

- A) ramo recorrente motor do nervo mediano no canal do carpo.
B) ramos sensitivos superficiais do nervo radial no antebraço distal.
C) nervo interósseo posterior na região do punho.
D) nervo ulnar no canal de Guyon.
E) ramos motores do interósseo anterior para o pronador quadrado.
-

28. Com quantas semanas de fertilização e embriogênese completa, todas as estruturas do membro superior já estão presentes?

- A) Seis
B) Quatro
C) Oito
D) Dez
E) Doze
-

29. Qual das alternativas abaixo NÃO é verdadeira em relação ao espaço de Parona?

- A) Espaço potencial profundo no antebraço distal volar
B) Repousa entre a fáscia do pronador quadrado e bainhas tendinosas dos flexores profundos dos dedos
C) Localiza-se entre os ligamentos radioescafo-capitato e radiosemilunar
D) Não tem continuação direta com a Bursa radial
E) Sem continuação direta com a Bursa ulnar
-

30. Qual nervo, no membro superior, é mais comumente afetado na hanseníase?

- A) Mediano
B) Radial
C) Axilar
D) Ulnar
E) Músculo cutâneo
-

31. Nos dedos, a polia cruciforme 1(C1) localiza-se

- A) entre A1 e A2.
B) entre A2 e A3.
C) entre A2 e C2.
D) proximal à A1.
E) distal à A4.
-

32. Em um artrodese do dedo mínimo, as articulações interfalangeanas proximal e distal devem ser fixadas em _____ e _____ graus, respectivamente.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas acima.

- A) 55 e 5
B) 45 e 5
C) 55 e 10
D) 45 e 10
E) 35 e 15
-

33. Qual é a variação normal do ângulo escafo-semilunar observado na radiografia, incidência de perfil?

- A) 40 e 60 graus.
B) 20 e 50 graus.
C) 30 e 60 graus.
D) 50 e 70 graus.
E) 60 e 80 graus.
-

34. A fase de remodelação de uma ferida inicia-se em torno do ____ dia e termina aproximadamente ao completar ____.
Assinale a alternativa cujos termos preenchem CORRETAMENTE as lacunas acima.

- A) oitavo/ seis meses.
B) décimo/três meses.
C) oitavo/ um ano.
D) décimo quarto/seis meses.
E) décimo/ dezoito meses.

35. Após um enxerto livre de pele, a _____ é a primeira etapa que ocorre para que haja a “pega” deste.
Assinale a alternativa cujo(s) termo(s) preenche(m) CORRETAMENTE a lacuna acima.

- A) inosculação
B) contração secundária
C) embebição
D) aderência
E) contração primária

36. Qual região da mão, innervada pelo mediano, NÃO apresenta alteração sensitiva em uma síndrome do túnel do carpo?

- A) Polpa digital do polegar
B) Extremidade dorsal e distal do 5º dedo
C) Tenar
D) Extremidade distal e volar do 4º e do 5º dedo
E) Hipotenar

37. De acordo com Mathes e Nahai, os retalhos musculares com dois pedículos vasculares dominantes são classificados como tipo

- A) I B) II C) III D) IV E) V

38. São contraindicações relativas do retalho de Moberg as citadas abaixo, EXCETO

- A) Lesão de um pedículo vascular.
B) Lesão vascular na região dorsal do polegar.
C) Defeitos proximais à articulação interfalangeana do polegar.
D) Perda de pele total, distal à articulação interfalangeana do polegar.
E) Lesão com mais de 2cm².

39. O retalho da artéria interóssea posterior, com fluxo reverso, é indicado para a cobertura de perdas cutâneas na mão. Uma das opções abaixo não é uma indicação para a cobertura do defeito com a rotação desse retalho.
Assinale-a.

- A) Região dorsal da mão.
B) Ferimento distal à articulação interfalangeana proximal.
C) Primeira comissura.
D) Região volar do punho
E) Região dorsal do punho.

40. Qual dos músculos abaixo, de acordo com a classificação de Mathes e Nahai, é considerado como sendo do tipo V?

- A) Grande dorsal
B) Tibial anterior
C) Vasto lateral
D) Gastrocnêmio
E) Reto femoral

41. Qual estrutura ou ligamento está comprometido nos portadores de dedo em botoeira?

- A) Cleland
 B) Triangular
 C) Colateral acessório
 D) Banda sagital
 E) Tendão extensor terminal

42. Na síndrome de Poland, há uma hipoplasia ou ausência do músculo

- A) peitoral menor. B) peitoral maior. C) grande dorsal. D) deltoide. E) subescapular.

43. Segundo os critérios de La Fontaine, são fatores de risco na avaliação da estabilidade das fraturas da extremidade distal do rádio as citadas abaixo, EXCETO

- A) Cominuição dorsal.
 B) Idade acima de 60 anos.
 C) Fratura da ulna associada.
 D) Traço de fratura intrarticular.
 E) Angulação dorsal maior que 15 graus.

44. O teste de Gerber é utilizado na avaliação de um dos músculos abaixo. Assinale a alternativa que o indica.

- A) Infraespinhal. B) Supraespinhal. C) Tríceps. D) Subescapular. E) Redondo maior.

45. Quais os dermatômos que correspondem ao polegar e dedo mínimo, respectivamente?

- A) C6 e C8. B) C5 e C7. C) C5 e C8. D) C6 e C7. E) C8 e T1.

46. Qual dos nervos abaixo tem sua origem no tronco superior do plexo braquial?

- A) Subescapular B) Peitoral lateral C) Axilar D) Supraescapular E) Frênico.

47. O _____ é um tumor benigno, com origem no tecido nervoso e está associado à doença de Von Recklinhausen. Assinale a alternativa cujo(s) termo(s) preenche(m) CORRETAMENTE a lacuna acima.

- A) neurilenoma
 B) schwannoma
 C) ganglioneuroma
 D) tumor de células gigantes
 E) neurofibroma

48. Qual o portal utilizado na artroscopia do punho, para ser realizado o inventário inicial da articulação rádio cárpica?

- A) 4-5. B) 6R. C) 6U. D) 3-4. E) 1-2.

49. Qual dos sinais ou sintomas abaixo aparece tardiamente em uma síndrome compartimental?

- A) Dor
 B) Palidez
 C) Parestesia
 D) Aumento da pressão intracompartimental
 E) Ausência de pulso

50. Assinale a alternativa que classifica, de acordo com Quinnell, paciente que apresenta dedo em gatilho e ativamente faz a extensão do dígito comprometido.

- A) Grau I. B) Grau II. C) Grau IIIA D) Grau IIIB. E) Grau IV.

GRUPO 05
- CIRURGIA DA MÃO -